

plukenetii Yamazaki, Journ. Jap. Bot. 27: 66. 1952.——*Calorhabdos axillaris* Benth. et Hook. f. ex S. Moore, Journ. Bot. 230. 1875, quoad specimen.——*Clematis cheusanensis* Plukenet, Opera, Amalteum Bot. ed. 2, 4: 60, tab. 384, f. 1. 1769. nom. illegit.

茎弓曲,顶端着地生根,多少被黄色倒生卷毛。叶长卵形至卵状披针形,膜质至纸质,长9—16厘米,宽3—6厘米。花序长1.5—5厘米;苞片及花萼裂片钻形,具睫毛或否。

产福建西北部、江西、湖南、贵州东北部、湖北(兴山)。生林下及林缘草地。

5. 宽叶腹水草(中国高等植物图鉴) 图 65

Veronicastrum latifolium (Hemsl.) Yamazaki, Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, 7: 130. 1957; 中国高等植物图鉴, 4: 46. 图 5505. 1975.——*Calorhabdos latifolia* Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 196. tab. 4, 1890.——*Botryopleuron latifolium* Hemsl. Hook. Icon. Pl. 27: sub tab. 2670, 1900.

茎细长,弓曲,顶端着地生根,长达1米余,圆柱形,仅上部有时有狭棱,通常被黄色倒生短曲毛,少完全无毛。叶具短柄,叶片圆形至卵圆形,长3—7厘米,宽2—5厘米,长略超过宽,基部圆形,平截形或宽楔形,顶端短渐尖,通常两面疏被短硬毛,少完全无毛,边缘具三角状锯齿。花序腋生,少兼顶生于侧枝上,长1.5—4厘米;苞片和花萼裂片有睫毛;花冠淡紫色或白色,长约5毫米,裂片短,正三角形,长不及1毫米。蒴果卵状,长2—3毫米。种子卵球状,长0.3毫米,具浅网纹。花期8—9月。

产四川(西至天全)、贵州、湖南、湖北。生林中或灌丛中,有时倒挂于岩石山。

与腹水草极近,体态和花冠几乎一致,但本种叶片短而宽,顶端短渐尖而非长渐尖,多少被毛,叶缘具三角状锯齿,茎大多数被短曲毛,与腹水草(亚种)异域分布而形态上可分,与细穗腹水草几乎同域,但形态上差别虽不大而却稳定且清楚可分,看来还是两个比较自然的种。

6. 爬岩红(浙江地方名、中国高等植物图鉴)、钓鱼杆、多穗草 图 66

Veronicastrum axillare (Sieb. et Zucc.) Yamazaki, Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, sect. 3, 7: 130. f. 20. 5 et 6, 1957.——*Paederota axillaris* Sieb. et Zucc. Alh. Akad. Muech. 4, 3: 144. 1846.——*Calorhabdos axillaris* (Sieb. et Zucc.) Benth. et Hook. f. ex S. Moore, Journ. Bot. 230. 1875, excl. specimen.——*Botryopleuron axillare* (Sieb. et Zucc.) Hemsl. Hook.



图 65 宽叶腹水草 *Veronicastrum latifolium* (Hemsl.) Yamazaki,
1. 植株; 2. 苞片及花; 3. 花冠(剖开)及雄蕊。(许介眉绘)