

Veronica forrestii Diels, Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 282. 1912; 中国高等植物图鉴, 4: 732. 1975.

茎匍匐或至少下半部匍匐, 长 5—20 厘米, 被长柔毛, 节间极短而叶密集至节间长达 3 厘米而叶疏生。叶椭圆形, 长 1—2 厘米, 宽 3—7 毫米, 厚纸质, 无毛, 顶端钝或急尖, 基部楔状渐狭成不明显的短柄或无柄, 下端全缘, 中上端每边有数枚尖锯齿。总状花序 1—2 支, 生茎中下部叶腋, 长 5—15 厘米, 有花数朵至十多朵; 花序轴及花梗密被多细胞长腺毛; 苞片条形或条状倒披针形, 比花梗短; 花梗直, 果期长近 10 毫米; 花萼裂片条状椭圆形, 长约 5 毫米, 被多细胞腺毛; 花冠红色或白色, 直径 10—12 毫米。蒴果折扇状菱形, 长 5 毫米, 宽 7 毫米, 基角约为 120° , 两侧角急尖至稍钝, 上缘有多细胞腺睫毛, 花柱长约 3 毫米。种子长 1 毫米。花期 6 月。

产云南(大理)。生海拔 2000—3000 米的林下。

本种以其特别的体态仅仅和产我国台湾的少籽婆婆纳相近, 但两者区别也很明显, 见检索表。

55. 少籽婆婆纳(中国高等植物图鉴)

Veronica oligosperma Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 128, fig. 47, a—i. 1915.

茎完全匍匐, 节上生根, 密被多细胞长柔毛。下部的叶具长 7 毫米的柄, 上部的叶柄较短, 叶片三角状圆形, 长 10—15 毫米, 宽 7—12 毫米, 两面疏被多细胞柔毛, 每边有 2—3 枚深刻而粗大的钝齿, 齿尖朝向叶顶端, 齿缘外卷而加厚。总状花序单支, 侧生于茎近顶端叶腋, 有花 1—4 朵, 具长 1—3 厘米的总梗, 除花冠外各部分均被多细胞柔毛; 苞片条形至条状披针形, 比花梗短; 花梗长约 6 毫米, 花期弯曲, 果期伸直; 花萼裂片长椭圆形, 长 4 毫米, 宽 1.5 毫米, 顶端钝, 疏被多细胞腺毛。蒴果折扇状菱形, 长 4—5 毫米, 宽 8—9 毫米, 有一圈多细胞腺质硬睫毛, 花柱长 5 毫米, 反折。种子卵状矩圆形, 长 1.6 毫米。花期 8—9 月。

产我国台湾。生海拔约 3000 米的高山上。

56. 西藏婆婆纳 图版 39: 1—3

Veronica tibetica Hong, sp. nov., in Addenda 404.

多年生草本, 植株高约 10 厘米, 具横走的根状茎。根须状, 粗壮, 直径达 1 毫米。茎数支丛生, 上升, 不分枝, 密被白色多细胞长柔毛。叶多对, 下部的较密集, 花期枯萎, 绿叶 3—4 对, 具长 5—7 毫米的柄, 上部叶的柄较短, 叶片三角状卵圆形至卵形, 长 1—2 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 上部的叶较大, 薄纸质, 顶端钝至急尖, 网脉明显, 两面