

部渐窄成柄,边全缘。花萼数条,纤细,倾卧或直立,高度不超过叶;穗状花序卵圆形,长1—1.5厘米,花密集;苞片卵状披针形,长约4—6毫米,下部的可达8毫米,纸质;花萼成两裂片状,约与花冠筒等长或稍短,后方开裂至1/3以下,除脉外均膜质透明,被长缘毛;花冠白色或微带粉红或紫色,长约5—6毫米,花冠筒伸直较唇部长,上唇全缘,卵形或卵状矩圆形,宽约1.5—2毫米,下唇2裂,裂片矩圆形,宽约1—1.2毫米;雄蕊贴生于上唇基部,较花冠稍短;花柱伸出花冠外,柱头头状;花盘4裂。果实红色,卵圆形,顶端大而微凹,光滑无毛。 花果期5—8月。

分布于甘肃、青海、西藏及四川西北部,海拔3200—4500米的高山草原、河滩、湖边砂质草地。全草入药,可治高血压、肺病、肺炎等症。

2. 裂叶兔耳草

Lagotis pharica Prain, Journ. Asiat. Soc. Bengal 65(2): 62. pl. 1. 1896; Li, Brittonia 8(1): 24. 1954. — *L. incisifolia* Hand.-Mazz. Sitz.-ber. Akad. wien 59: 252. 1922, et Symb. Sin. 7: 841. 1936; 中国高等植物图鉴 4: 735. 1975.

多年生矮小草本,高4—15厘米。根状茎短而小,根多数簇生,细长条形,肉质,根颈上覆盖有干膜质、褐色、卵形鳞片2—4枚,而无老叶残遗物包裹。匍匐茎长7厘米以上,纤细。叶2—6片,全部基生,叶柄长1.2—5(7)厘米,扁平,具窄翅,基部鞘状扩大;叶片卵形至矩圆形,与叶柄等长或较短,顶端钝,基部宽楔形至截形,羽状深裂,裂片3—5,条形,具钝锯齿。花萼1—3条,上升,与叶近等长,稍粗壮;穗状花序卵圆形,长1.5—2.5厘米,花稠密,或近基部的稍疏稀;苞片宽倒卵形至卵状矩圆形,长4—6毫米,在花序下部的较花稍长,顶端边缘有圆锯齿,上部的与花等长,全缘,质厚,被短毛;花萼裂片2,披针形,长2—3毫米,被缘毛;花冠紫堇色,长4—5.5毫米,花冠筒伸直,筒状,与唇部近等长,上唇常2裂,下唇3裂,裂片均为条状矩圆形;雄蕊的花丝与唇等长或超出;花柱较唇短,细弱,柱头小,头状或微凹。果实狭卵圆形。 花期5月。

分布于西藏东南部、四川西部,海拔4300米的高山草原。

3. 紫叶兔耳草(新拟)

Lagotis praecox W. W. Smith, Notes Bot. Gard. Edinb. 11: 217. 1919.

多年生草本,高5—18厘米。根状茎伸长,粗壮,长可达6厘米,根系特别发达,根多而长,肉质,可达25厘米。叶少或多数,全部基生,近革质,叶柄及叶下面均为紫红色;叶柄长4—7(11)厘米,有窄翅,基部强烈扩张成鳞鞘状,老时残留于根颈外;叶片肾形、圆形至卵形,长4—7厘米,顶端圆或钝,基部心形、截形至宽楔形,边缘具大

圆齿。花葶 1—5 条，蜿蜒状上升，与叶近于等长；穗状花序卵球状，长 1.5—2.5 厘米，苞片倒卵形或近圆形，下部的长达 1.5 厘米，近革质，密覆瓦状排列，花全部被包于内；萼前后方均开裂成 2 萼裂片，薄膜质，萼裂片披针状矩圆形，边缘具细微流苏状；花冠蓝色，长约 6 毫米，花冠筒伸直，与唇部约等长，上唇矩圆形，顶端全缘，微凹或 2 裂，下唇 2(3) 裂，裂片披针形；雄蕊 2，伸出花冠外；花柱短或长于花冠，柱头头状。果实椭圆状矩圆形，长约 7 毫米，成熟时 1 室，含种子 1 颗。 花果期 7—8 月。

分布于四川西部及云南西北部，海拔 4500—5200 米的高山草地、砂砾及风化的页岩上。

4. 圆穗兔耳草(中国高等植物图鉴) 图 89

Lagotis ramalana Batalin, Act. Hort. Petrop. 14: 177. 1895; 中国高等植物图鉴 4: 49. 图 5511. 1975.

多年生矮小草本，高约 5—8 厘米。根状茎斜走，长达 5 厘米；根多数，条形，肉质，长可达 15 厘米以上。叶 3—6 片，全部基生；叶柄长 1—3(5) 厘米，扁平，翅宽，基部鞘状扩张；叶片卵形，与叶柄近等长，顶端圆钝，基部宽楔形，边缘具圆齿。花葶通常 2 至数条，直立或斜卧，较叶稍长，或偶有短于叶的；穗状花序卵球状，长约 1.5—2 厘米；苞片倒卵形至匙形，下部的长约 8 毫米，纸质；萼裂片 2 枚，分生，披针形，薄膜质，边缘有细缘毛，比花冠短 2.5 倍；花冠蓝紫色，长约 6—7 毫米，花冠筒伸直，比唇部约长 1 倍，上唇卵形至矩圆形，宽约 1.5—2 毫米，顶端微凹或平截，下唇 2 裂，裂片长椭圆形；雄蕊 2，伸出花冠外；花柱较花冠稍短，柱头小，头状。果实椭圆形，长约 7 毫米，含种子 1 颗。 花果期 5—8 月。

分布于甘肃、青海、四川西北部及西藏等地，海拔 4000—5300 米的高山草地。不丹也有分布。

5. 倾卧兔耳草

Lagotis decumbens Rupr. Sertum. tiansch. 64. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 559. 1885; N. V. Vikulova in Fl. URSS 22: 506. t. 24. f. 1. 1955.——*L. glauca* ssp. *australis* Maxim. Bull. Acad. St. Pétersb. 27: 524. 1881. ex parte.

多年生矮小草本，高 8—15 厘米，全体无毛；根状茎短缩，直径约 6 毫米，根多数，条形，在老株根颈上被 1—3 层卵状鳞片。茎 1—3 条，倾卧状上升，长 5—10 (20) 厘米，纤细。基生叶 5—10 枚，具长叶柄，长 6—7 厘米；叶片卵状矩圆形至卵状椭圆形，长 2.5—6 厘米，顶端钝，基部宽楔形，边缘具粗锯齿；茎生叶 3—4 枚，无柄或具有短