

Merr., 而不属于本种,但他却照引了。

2. 矮胡麻草 图版 43: 1—4

Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. Sunyatsenia 5: 182. 1940; 广州植物志 591. 1956; 海南植物志 3: 512. 1974.——*Razumovia tranquebarica* Spreng. Fl. Hal. Mant. 45. 1807; Merr. Bull. Torr. Bot. Club. 64: 597. 1937.——*Centranthera humifusa* Wall. Cat. no. 3883. 1830. nom. nod. ex Benth. Scroph. Ind. 50. 1835, et in DC. Prodr. 10: 525. 1846; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 301. 1884; Dunn et Tutch. Kew Bull. add. ser. 10: 190. 1912; Bonati, in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 447. 1927.——*C. tranquebarica* (Spreng.) Yamazaki Journ. Jap. Bot. 25: 209. 1950.

柔弱草本,下部被硬毛,向上毛渐减少,上部几无毛。茎直立或倾卧,自下部分枝;枝细弱,多匍匐而后上升,稠密成丛,长5—20厘米。叶对生,下部的偶有互生,无柄,全缘,条状披针形,通常长8—25毫米,宽2—3毫米,先端渐尖,无毛或在背面凸起的中脉及多少背卷的边缘上被短毛,两面有粗糙鳞片状凸起;苞片与叶同形,超过花冠;花冠长约9毫米,黄色,具褐色条纹;上唇长3毫米,喉部密被黑色细点,裂片近圆形,其直径约2毫米;下唇裂片多少矩圆形,先端略尖,宽约2毫米;雄蕊前方一对长5毫米,花丝上部密被白色绵状长柔毛;后方一对长4毫米,花丝上部疏被长柔毛;成熟药室矩圆形,先端具短尖头,不成熟药室退化成锥状而较长;子房矩圆形,长约3毫米,宽2.5毫米,无毛,花柱顶部略成倒卵形。蒴果近于圆形,长4—5毫米,宽约4毫米,与宿萼等长。种子柱状圆锥形,长约1毫米,黄色,具网纹。 花果期7—10月。


分布于广东中部向南至海南岛。生于山坡草地,路旁瘠地上。 南亚及东南亚也有。

Bonati 在 Fl. Gén. Indo-Chine 4: 447. 1927 的记载中说雄蕊为5枚,但在我们的标本中,却未见到。

3. 细瘦胡麻草

Centranthera tonkinensis Bonati, Not. Syst. Lecomte 1: 337. 1911. et in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 4: 447. 1927; Merr. in 150th Anniv. vol. Bot. Gard. Calcutta 58. 1942.——*Razumovia tonkinensis* (Bonati) Merr. Bull. Torr. Bot. Club. 64: 598. 1937.

直立纤细草本,几无毛,高20—30厘米。茎具狭棱,下部疏被硬毛,单一或在中部以上分枝;枝伸长,多少弯曲上升。叶全部对生,无柄,条形,全缘,多少肉质,两面



1—4.矮胡麻草 *Centranthera tranquebarica* (Spreng.) Merr. 1.植株; 2.花冠纵剖面及雄蕊; 3.雌蕊; 4.花萼。5—8.胡麻草 *C. cochinchinensis* (Lour.) Merr. 5.植株; 6.花冠纵剖面及雄蕊; 7.花萼; 8.雌蕊。(王金凤绘)