

米,通常黄色,裂片均为宽椭圆形,长约4毫米,宽7—8毫米;雄蕊前方一对长约10毫米,后方一对长6—7毫米;花丝均被绵毛;子房无毛;柱头条状椭圆形,长约3毫米,宽约1毫米,被柔毛。蒴果卵形,长4—6毫米,顶部具短尖头。种子小,黄色,具螺旋状条纹。 花果期6—10月。

分布于长江流域以南各省区。生于海拔500—1400米间的路旁草地,干燥或湿润处。南亚,东南亚及大洋洲也有。

西南胡麻草(变种)

var. **nepalensis** (D. Don) Merr. in 150th Anniv. Vol. Bot. Gard. Calcutta 56. 1942.—*Centranthera nepalensis* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 88. 1825.—*C. hispida* auct. non R. Brown; Benth. Scroph. Ind. 50. 1835; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4; 301. 1884. pro majore parte.—*Razumovia cochinchinensis* (Lour.) Merr. var. **nepalensis** (D. Don) Merr. Bull. Torr. Club 64; 595. 1937.

与原变种的区别在于,花较小,花冠通常长约15—16毫米,稀达22毫米,淡紫色或紫红色,抑或近于白色。 花果期8—10月。

全草药用。

分布于云南、四川、西藏等省区。生于海拔700—1500米间之旷野、田边草地或林下。尼泊尔,印度,斯里兰卡亦有。

长花胡麻草(变种)

var. **longiflora** (Merr.) Tsoong, comb. nov.—*Razumovia longiflora* Merr. Bull. Torr. Bot. Club. 64; 593. 1937.—*Centranthera longiflora* (Merr.) Merr. in 150th Anniv. Vol. Bot. Gard. Calcutta, 56. 1942.

与以上两变种的区别在于,花大,长35—40毫米;花冠白色带红而有黄色条纹,植株较粗壮。 花果期7—10月。

分布于广东、云南。生于海拔600—800米间之干草坡及靠水塘的草地上。越南,老挝,柬埔寨也有。

39. 黑蒴属——*Melasma* Berg.

Berg. Desc. Pl. Cap. 162. 1767.

直立、坚挺、通常粗糙草本,干后常变成黑色。叶对生或有时上部互生,无柄,全缘或有锯齿,基出3脉。花单生于苞腋内,集成顶生穗状或总状花序,基部常间断;小