

系 91 玫瑰系——Ser. Roseae Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. XXXII (1888) 617, et in Mém. Biol. XII (1888) 129.

265. 藓状馬先蒿

Pedicularis muscoides Li, in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. CI (1949) 91.

藓状馬先蒿藓状变种 图版 LXIX, 1—4

Pedicularis muscoides Li var. **muscoides**——*P. muscoides* Li var. *typica* Li, in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. CI (1949) 91, f. 151.

极低矮的草本，連花高不及 4 厘米，干时变黑。根成束，很变粗，肉質。茎花葶状，长几不达 1 厘米。叶基生者有长柄，柄細长，1—1.5 厘米，有毛，叶片长圓状披針形，长约 1 厘米，寬 2—3 毫米，无毛或有微毛，端鈍，邊緣羽状全裂或近端的一方为深羽状开裂，裂片每边 8—10 枚，卵形，有鋸齿。花少数，每茎仅两三枚；苞片叶状，长圓状披針形，长约 1 厘米，寬 2—3 毫米，前方羽状开裂；花梗长 2—3 毫米；萼长圓状卵圓形，长约 8 毫米，寬 3—4 毫米，有毛，脉 5 条，上部微有网紋，齿 5 枚，不相等，狭三角形，长 2—2.5 毫米，微有波齿而近于全緣；花冠浅色，长约 2.3 厘米，管长约 11 毫米，端稍稍向前弯曲并略扩大，盔多少前俯，长约 1.2 厘米，寬 3—4 毫米，額圓形，下緣前端尖，无齿；下唇长约 9 毫米，裂片圓形，全緣，中裂圓形，約为斜倒卵形側裂的半大，向前伸出一半；花絲着生管基，前方 1 对近端处有毛，药长圓形，药室基部微尖；花柱伸出。蒴果长圓状卵圓形，多少扁平而偏斜，长约 11 毫米，寬 4 毫米，銳头。花期 6 月。

为我国特有种，产四川西部（貢嘎山），西藏昌都专区（念青唐拉）和拉薩附近的山上，生于海拔 3,950—5,335 米的地方。

藓状馬先蒿玫瑰色变种

Pedicularis muscoides Li var. **rosea** Li, in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. CI (1949) 92.

与前一变种的不同，在于花冠較短，长约 1.2 毫米，花色为鮮艷的玫瑰色。

产我国云南西北部（白馬山），生于海拔 4,270—4,575 米的沼泽草甸中。

系 92 迈氏系——Ser. Merrillianae Tsoong, ser. nov.

266. 迈氏馬先蒿 图版 LXIX, 5—8

Pedicularis merrilliana Li, in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. CI (1949) 96, f. 155.

多年生草本，干时变为黑色，植株低矮，一般高約 4 厘米，可达 8 厘米。根有分枝，