

亚羣 21 根叶亚羣——Subgrex RHIZOPHYLLUM——Sect. PHANERANTHA, Li, l. c. 143.——Sect. DOLICHOMISCUS Li, l. c. 157, pro parte.——Sect. SCHIZOCALYX Li, l. c. 177, pro parte.

系 102 火焰系——Ser. Flammeae Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc. III (1890) 100.

分 种 检 索 表

- 1(2) 苞片綫状披針形至綫形,端有时叶状;萼齿披針形至綫形,极少狭长三角形……………289. 欧氏馬先蒿 *P. oederi* Vahl
2(1) 苞片菱状卵形,上部具鈍齿而下部楔形全緣;萼齿三角形……………290. 直茎馬先蒿 *P. orthocoryne* Li

289. 欧氏馬先蒿

Pedicularis oederi Vahl, in Hornem. Dansk. Plantel. ed. 2 (1806) 380; Prain, in Ann. Bot. Gard. Calc. III (1890) 181; Limpr. in Repert. Sp. Nov. XX (1924) 202; Li, in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. CI (1949) 86.——*P. versicolor* Wahlenb. Veg. Helvet. (1813) 118; Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. XXIV (1877) 88, et XXXII (1888) 618, et in Mém. Biol. X (1877) 133, et XII (1888) 918.

欧氏馬先蒿欧氏亚种欧氏变种欧氏变型

Pedicularis oederi Vahl subsp. *oederi* var. *oederi* forma *oederi*——*P. versicolor* Wahlenb. var. *europaea* Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. XXXII (1888) f. 177a, et in Mém. Biol. XII (1888) f. 177a.——*P. oederi* Vahl var. *typica* Prain, in Journ. As. Soc. Beng. LVIII (1889) 276, et in Ann. Bot. Gard. Calc. III (1890) 181, t. 34 A; Limpr. in Repert. Sp. Nov. XX (1924) 202; Li, in Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. CI (1949) 87.

多年生草本,体低矮,高5—10厘米,极少有达15厘米以上者,干时变为黑色。根多数,多少紡錘形,粗者径可达1厘米左右,肉质;根頸粗,頂端常生有少数卵形至披針状长圓形的宿存膜質鱗片。茎草質多汁,常为花葶状,其大部长度均为花序所占,多少有綿毛,有时几变光滑,有时很密。叶多基生,宿存成丛,有长柄,柄长者达5厘米,一般較短,毛被亦多变,叶片长1.5—7厘米,綫状披針形至綫形,羽状全裂,在芽中为拳捲,而其羽片則垂直相迭而作魚鰓状排列,此种特征有时在叶子舒放后很久尚留存,裂片多数,常紧密排列,其間的距离一般小于羽片本身,其数每边10—20,多