

南热带材及亚热带材), 光灰楸(中国高等植物图鉴) 图版5: 6—7

C. fargesii Bur. f. **duclouxii** (Dode) Gilmour in Curtis's Bot. Mag. **159**: tab. 9458. 1936; Rehd. Cult. Trees Shrubs, ed. **2**: 823. 1940; J. Paelt in Candollea **13**: 256. 1952; 中国高等植物图鉴 **4**: 130. 1975; 云南植物志 **2**: 704, 图版 196, 图 6. 1979. ——*Catalpa duclouxii* Dode in Bull. Soc. Dendr. France **1907**: 201. 1907; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 304. 1912, **3**: 433. 1917; Hand. -Hazz. Symb. Sin. **7**: 889. 1934. ——*C. sutchuenensis* Dode in Bull. Soc. Dendr. France **204**. 1907. ——*C. fargesii* Wils. Arn. Arbor. Exped. China 1901-11, fig. 192. 1912.

与原变型的区别: 叶片、花序均无毛。

产湖北、湖南、四川、贵州、云南等地。生于村庄、公路附近。模式标本采自云南洱源。

本种木材可防虫蚁, 在云南为珍贵的商用硬材, 用作高级家具及装饰用材; 根、叶、花均可入药, 治耳底痛、胃痛、咳嗽、风湿痛。

7. 翅叶木属——*Pauldopia* van Steenis

van Steenis in Acta Bot. Neerl. **18**: 425. fig. 1969.

灌木或小乔木。叶对生, 为 2—3 回羽状复叶, 叶轴具有狭翅; 小叶近无柄, 上面有细小白鳞片状毛及突起, 下面密生小凹槽, 疏生菌状腺体。圆锥花序多花。花萼钟状, 5 浅裂。花冠筒筒状, 裂片 5, 半圆形。雄蕊 4, 2 强。蒴果长圆柱形, 果皮薄革质, 隔膜膜质。种子扁圆球形, 厚, 几无翅。

单种属, 分布于我国云南, 以及越南、老挝、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡、印度。

本属与菜豆树属 *Radermachera* 及羽叶楸属 *Stereospermum* 相似。其叶表面具细白鳞片状毛及突起, 背面密生小凹槽, 并且极疏生盘菌状腺体, 叶 2—3 回奇数羽状复叶, 叶轴有翅, 易于区别。

1. 翅叶木(云南植物志) 细口袋花(西双版纳), 紫豇豆(景洪), 金丝岩柘(耿马) 图版 4: 4—6

Pauldopia ghorta (Buch. -Ham. ex G. Don) van Steenis in Acta Bot. Neerl. **18**: 425. 1969; 云南植物志 **2**: 707, 图版 194, 图 4—6. 1979; Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal **3**: 137 1982; Santisuk et Vidal in Fl. Camb. Laos et Viet. **22**: 14. 1985. ——*Bignonia ghorta* Buch. -Ham. [ex G. Don in Wall. Cat. 221, n. 6510. 1832. nom. nud.] ex G. Don, Gen. Syst. **4**: 222. 1838; A. DC. Prodr. **9**: 169. 1845. ——*Stereospermum ghorta* (Buch. -Ham. ex G. Don) Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 384. 1884. ——*Tecoma bipinnata* Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **28**: 102. 1890. ——*Radermachera bipinnata* (Coll. et Hemsl.) van Steenis ex Chatterjee