

分 种 检 索 表

1. 小叶 7—9 枚, 叶下面无毛; 花萼 5 裂至 1/2 处, 裂片大, 披针形 1. 凌霄 *C. grandiflora* (Thunb.) Schum.
 1. 小叶 9—11 枚, 叶下面被毛, 至少沿中脉及侧脉及叶轴被短柔毛; 花萼 5 裂至 1/3 处, 裂片短, 卵状三角形 2. 厚萼凌霄 *C. radicans* (L.) Seem.

1. 凌霄(图经本草) 紫葳(植物名实图考), 苕华(神农本草经), 堕胎花(云南), 白狗肠(广西), 搜骨风(四川), 藤五加(贵州), 过路蜈蚣(湖南), 接骨丹(湖北), 九龙下海(江西), 五爪龙(江苏), 上树龙(安徽) 图版 1: 1—3

Campsis grandiflora (Thunb.) Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 230. 1894; 陈嵘, 中国树木分类学 1115, 图 1005. 1937; Nasir, Fl. West Pakistan 668. 1972; 中国高等植物图鉴 4: 104, 图 5621. 1974; 云南植物志 2: 714. 1974; Santisuk et Vidal in Fl. Camb. Laos et Viet. 22: 61. 1985. — *Bignonia grandiflora* Thunb. Fl. Jap. 253. 1784. — *B. chinensis* Lam. Encycl. 1: 423. 1785; A. DC. Prodr. 9: 172. 1845. — *Campsis adrepens* Lour. Fl. Cochinch. 378. 1790; Franch. Pl. David. 1: 228. 1883. — *Tecoma grandiflora* Loisel. Herb. Gen. Amat. 5: 286. 1821. — *T. chinensis* K. Koch, Dendr. 2: 307. 1872. — *Campsis chinensis* (Lam.) Voss. in Vilm. Blumengart. ed. 3, 801. 1895; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 303. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 166. 1927.


攀援藤本; 茎木质, 表皮脱落, 枯褐色, 以气生根攀附于它物之上。叶对生, 为奇数羽状复叶; 小叶 7—9 枚, 卵形至卵状披针形, 顶端尾状渐尖, 基部阔楔形, 两侧不等大, 长 3—6(—9) 厘米, 宽 1.5—3(—5) 厘米, 侧脉 6—7 对, 两面无毛, 边缘有粗锯齿; 叶轴长 4—13 厘米; 小叶柄长 5(—10) 毫米。顶生疏散的短圆锥花序, 花序轴长 15—20 厘米。花萼钟状, 长 3 厘米, 分裂至中部, 裂片披针形, 长约 1.5 厘米。花冠内面鲜红色, 外面橙黄色, 长约 5 厘米, 裂片半圆形。雄蕊着生于花冠筒近基部, 花丝线形, 细长, 长 2—2.5 厘米, 花药黄色, 个字形着生。花柱线形, 长约 3 厘米, 柱头扁平, 2 裂。蒴果顶端钝。花期 5—8 月。

产长江流域各地, 以及河北、山东、河南、福建、广东、广西、陕西, 在台湾有栽培; 日本也有分布, 越南、印度、西巴基斯坦均有栽培。

可供观赏及药用, 花为通经利尿药, 可根治跌打损伤等症。据李时珍云“附木而上, 高达数丈, 故曰凌霄”。

本种喜温湿环境, 用压条、扦插及分根繁殖。

2. 厚萼凌霄(广西) 美国凌霄(中国树木分类学), 杜凌霄(江苏、湖南)



1—3.凌霄 *Campsis grandiflora* (Thunb.) Schum.: 1.花枝, 2.雄蕊, 3.花雌和
雄蕊。4—6.羽叶照夜白 *Nyctocalos pinnata* van Steenis: 4.花枝, 5.果实, 6.种子。
(吴锡麟绘)