

I. variabilis var. *przewalskii* Batalin in Acta Hort. Petrop. 7: 177 1892——*I. sinensis* subsp. *variabilis* f. *przewalskii* Grierson in Not. Bot. Gard. Edinb. 23 (3): 325. 1961.

本变种与角蒿极近似,但花淡黄色,叶及毛被形态多变异而不同。花期7—9月。

产甘肃、陕西、青海、四川西北部。生于山坡,海拔2000—2600米。模式标本采自四川西北部接近甘肃的地区。

2. 聚叶角蒿

Incarvillea potaninii Batalin in Acta Hort. Petrop. 11: 492. 1892 et 14: 179. 1895.

多年生小草本,高约20厘米至25厘米,具茎。叶互生,多聚生于茎基部,1回羽状分裂,叶轴长约6厘米;小羽片卵形,3—7枚,大小不等,长达2厘米,宽5—10毫米,边缘呈极不规则的浅裂或深裂。顶生总状花序;花序梗长8—15厘米;花梗长2—5毫米。花萼钟状,长和宽均为4—5毫米,萼齿钻状,基部膨大呈腺体,长约4毫米。花冠红色,漏斗状,长4—4.5厘米,基部收缩呈细筒,基部直径3毫米,中部和喉部直径均10毫米,花冠裂片圆形,开展,长约1.2厘米,宽1.5厘米,边缘具睫毛。退化雄蕊长1厘米,顶端膨大。蒴果长圆柱形,顶端渐尖,长5—6厘米,粗约5毫米。种子卵形至近圆形,长4.5毫米,宽2.5毫米,翅薄膜质、透明,宽1.5—2毫米。

可能产内蒙古。生于石山半坡上。在蒙古也有分布。本种近角蒿,但叶为1回羽状分裂,多聚生于茎基部。

亚属2. 两头毛亚属——Subgen. *Amphicome* (Royle) R. Br. apud Royle, Ill. Bot. Himal. 296. 1836; Grierson in Not. Bot. Gard. Edinb. 23 (3): 313. 1961. ——*Amphicome* Royle, Ill. Bot. Himal. tab. 72, fig. 1. 1835.; A. DC. Prodr. 9: 237. 1845; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1048. 1876; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 385. 1885; Schum. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 232. 1894.

花冠筒基部内面被长柄状腺毛。花药裂片被疏柔毛。蒴果细长,线状圆柱形;隔膜顶端2裂。种子狭卵形,两端有长的簇毛。

2种,我国有1种。

3. 两头毛(云南植物志) 毛子草(中国高等植物图鉴),千把刀、破碗花、大花药(云南丽江),麻叶子、大九加、岩喇叭花、鼓手花、羊胡子草、城墙花(云南曲靖),金鸡豇豆、喷呐花、羊奶子、燕山红(云南昭通),黄鸡尾、马桶花、蜜糖花(四川),炮仗花(贵州威宁)

Incarvillea arguta (Royle) Royle, Ill. Bot. Himal. 296. 1836; Burtt et Grierson in Not. Bot. Gard. Edinb. 21: 155. 1953; Grierson, l. c. 23 (3): 314. 1961; 中国高等植物图鉴 4: 99, 图 5611. 1975; 云南植物志 2: 716, 图版 199, 图 3—6. 1979; Hara