

本属共约 16 种,分布于亚洲热带地区。我国产 1 种,分布于南部和西南部。

1. 假野菰(中国高等植物图鉴) 竹花、竹子花(四川),花菰(海南) 图版22: 9—15.

Christisonia hookeri Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 321. 1884; G. Beck in Engler, Pflanzenr. IV. 261 (Heft 96): 314, fig. 20(E-F). 1930; Z. Y. Zhang in Acta Phytotax. Sin. 24(4): 301, fig. 1(9—15). 1986. — *C. sinensis* G. Beck, l.c. 314, fig. 20(G-J). 1930; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 875. 1936; 海南植物志 3: 515. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 109, 图 5632. 1975. — *Gleadovia lepoense* Hu in Sunyatsenia 4(1—2): 6, pl. 3. 1939. — *G. kwangtungense* Hu, l.c. 7, pl. 1. 1939.

植株大小有变化,高 3—8 (—12) 厘米,常数株簇生,近无毛。茎极短,不分枝,长 1—2 厘米。叶少数,卵形。花常 2 至数朵簇生于茎的顶端。苞片长圆形或卵形,长约 0.8—1 厘米,宽 5—6 毫米,近无梗或具极短的梗。花萼筒状,长度有变异,干后近膜质或近革质,长 1.5—3 厘米,顶端常不整齐 5 浅裂,极稀 4 浅裂,裂片三角形或披针形,不等大,其中 2 枚较大,长 0.5—1 厘米,其余的较小,长 4—8 毫米,顶端急尖稀钝。花冠筒状,长 2—7 厘米,常白色,稀浅紫色,顶端 5 裂,裂片近圆形,全缘。雄蕊 4 枚,内藏,花丝着生于筒的近基部,长 0.8—1 厘米,无毛或基部疏被腺毛,花药粘合,上方的两枚雄蕊 1 室,发育,卵球形或椭圆体形,3—4 毫米长,下方的两枚雄蕊 1 室发育,另一室退化成棍棒状附属物,附属物长 4—6 毫米,基部具小尖头。子房 1 室,胎座 2,卵形,花柱长 2.5—4 厘米,无毛,稀上部被稀疏的腺毛,柱头大,盘状,直径 4—6 毫米。果实卵形。种子小,多数。花期 5—8 月,果期 8—9 月。


产广东北部和南部(仁化、信宜)、海南(崖县、乐东、琼中)、广西西南部(龙州)、四川(峨边、雷波、南川金佛山)、贵州东部(榕江)和云南东南部(屏边)。常生于竹子林下或潮湿处,海拔 1500—2000 米。斯里兰卡也有分布。

本种是一个多型性的种,它的体态及大小、花萼形状、质地、长度及分裂度等,都有很大变异,甚至同一产地的标本也有变异。前人都将我国产的假野菰属植物定名为 *G. sinensis* G. Beck。但实际上 *C. sinensis* G. Beck 与 *C. hookeri* Clarke 应是同一种植物,因此应采用较早的名称。

5. 肉苁蓉属*——*Cistanche* Hoffmg. et Link

Hoffmg. et Link, Fl. Port. 1: 319, tab. 63. 1809; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 983. 1876; G. Beck, Monogr. Orob. 58. 1890; et in Engler, Pflanzenr. IV. 261 (Heft 96): 26. 1930; Z. Y. Zhang

* 内蒙古大学学报。



1—8. 齿鳞草 *Lathraea japonica* Miq.: 1. 植株, 2. 花萼展开, 3. 花冠展开, 4. 雌蕊, 5. 雄蕊, 6. 子房横切面, 7. 果实, 8. 种子。9—15. 假野菰 *Christisonia hookeri* Clarke: 9. 植株, 10. 花侧面观, 11—12. 花萼展开, 13—14. 雄蕊, 15. 雌蕊。(吴影桦绘)