

产广东(信宜、博罗、新丰、英德)。生于山谷溪边石上或林中,海拔 650—1 000 米。模式标本采自罗浮山。

3. 世纬芭苔属*——*Tengia* Chun

Chun in *Sunyatsenia* 6(3—4): 279. 1946.

多年生草本,具短根状茎。叶基生,具柄,椭圆形,叶脉羽状。聚伞花序腋生,有少数花;花小,辐射对称。花萼钟状,5 裂达基部,裂片披针状条形。花冠近壶状,筒比檐部长;檐部 5 裂,裂片狭三角形,近直展。雄蕊 5,与花冠裂片互生,着生于花冠近基部处,内藏,花丝狭线形,直,花药底着,近肾形,顶端有小尖头,2 室近个字形,顶端汇合。花盘环状,全缘。雌蕊稍伸出花冠之外,子房细圆锥状筒形,1 室,2 侧膜胎座内伸,2 裂,裂片有多数胚珠,花柱比子房长,柱头小,点状。蒴果线形,直,最后裂成 4 瓣,种子小。

1 种,产贵州。

1. 世纬芭苔(中国种子植物科属辞典) 黔芭苔(中国高等植物图鉴) 图版 35

Tengia scopulorum Chun in *Sunyatsenia* 6(3—4):281, pl. 46. 1946; 中国高等植物图鉴 4:122, 图 5657. 1975.

多年生小草本。叶具长柄;叶片纸质,两侧不相等,椭圆形、椭圆状长圆形或狭倒卵形,长 3—6 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,顶端急尖,偶尔钝,基部楔形或宽楔形,边缘在基部之上有不规则浅齿,上面疏被短伏毛,下面沿中脉及侧脉疏被短曲毛,中脉下面稍隆起,侧脉每侧 4—5 条,与中脉成锐角展开;叶柄长 1.5—6 厘米,被白色伏毛及灰鳞片。聚伞花序有 8—10 花;花序梗长 4—5 厘米,密被褐色柔毛;花梗丝形,长 4—5 毫米,和花萼有与花萼相同的毛被。花萼 5 全裂,裂片披针状线形,长 2.5—3 毫米,顶端微钝。花冠白色带粉红色,长 5—7 毫米,粗 3—4 毫米,外面被疏柔毛,内面无毛,在中部之上稍变细,5 裂,裂片狭三角形,长约 3 毫米,宽 1 毫米,顶端尖,有 3 条脉。雄蕊 5,着生于花冠近基部处,花丝长约 2.5 毫米,花药长约 1 毫米,顶端有小尖头。雌蕊长 5.5—7 毫米,子房长 2.5—3 毫米,粗 1 毫米,与花柱均密被短伏毛;花柱长 3—4 毫米。蒴果线状披针形,长约 1.5 厘米,褐色,变无毛。花期 8 月。


产贵州平伐(位于贵阳东南)。生于山地石崖阴处。

4. 苦芭苔属——*Conandron* Sieb. et Zucc.

Sieb. et Zucc. in *Abh. Akad. Muench.* 3: 729. 1843.

多年生草本,具短根状茎。叶基生,椭圆状卵形,具羽状脉。聚伞花序腋生,2—3 回分

* 植物分类学报,2 卷 4 期。



世纬苔 *Tengia scopulorum* Chun: 1. 植株全形, 2. 花, 3. 花冠打开, 4. 雄蕊, 5. 花盘及雌蕊, 6. 子房横切面。(冯晋庸绘)