

丝长约 1 厘米,被短柔毛,花药宽长圆形,长 1.2 毫米,药室 2,平行,不汇合;无退化雄蕊。花盘环状,高约 1 毫米。雌蕊无毛,子房线状长圆形,长 1.2 厘米,直径约 1 毫米,花柱长约 6 毫米,柱头 2,相等,卵圆形,长约 1 毫米。蒴果未见。 花期 2 月。

产海南白沙。

18b. 锈毛马铃苣苔(变种)

O. dasyantha var. **ferruginosa** K. Y. Pan in Acta Phytotax. Sin. **25**(4): 283. 1987.

与原变种的主要区别:叶上面除被短柔毛外,还被有淡褐色长柔毛,基部楔形;叶柄较短,长达 6 厘米。聚伞花序伞状,具 3—7 花,花较小,花冠长 1.6 厘米,筒长约 9 毫米。

产海南。生于林中岩石上。模式标本采自海南定安。

组 3. 大叶石上莲组——Sect. *Oreocharis*, K. Y. Pan in Acta Phytotax. Sin. **25**(4): 283. 1987.——*Oreocharis* subgen. *Euoreocharis* Clarke in A. DC. Monogr. Phan. **5**: 63. 1883; Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. **21**: 206. 1954; H. W. Li in Bull. Bot. Res. **3**(2): 11. 1983.——*Oreocharis* sect. *Euoreocharis* (Clarke) Fritsch in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4**(3b): 145. 1895.——*Dasydesmus* Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. **11**: 253. 1919.

聚伞花序不分枝或 2—3 次分枝;花冠细筒形,稀粗筒状,喉部不缢缩,向基部渐狭窄,筒部为檐部的(2.5—)3—5(—7)倍,檐部二唇形或稍二唇形,5 裂,裂片近圆形,稀长圆形;花药宽长圆形,2 室,平行,纵裂,顶端不汇合。种皮具刺状突起,极少具小瘤状突起。花粉粒外壁小块状,具刺状突起,块间具穿孔。

约 7 种,2 变种。产四川西南部、云南、广西、广东、福建、江西、湖南。

19. 紫花马铃苣苔(植物分类学报)

Oreocharis argyreia Chun ex K. Y. Pan in Acta Phytotax. Sin. **25**(4): 283. 1987.

19a. 紫花马铃苣苔(原变种) 图版 42: 6—8

O. argyreia var. **argyreia**

多年生无茎草本。叶全部基生,具柄;叶片狭椭圆形,长 5.5—13 厘米,宽 2.7—6.5 厘米,顶端锐尖,基部窄楔形,近全缘,两面均被贴伏长柔毛,侧脉每边 5—7 条,下面微凹陷;叶柄长 2—7 毫米,密被贴伏长柔毛。聚伞花序 2—3 次分枝,2—6 条,每花序具 5—12 花;花序梗长 10—20 厘米,被长柔毛;苞片 2,长圆形,长约 8 毫米,宽约 2 毫米,顶端渐尖,全缘,被长柔毛;花梗长 1.5—2 厘米,被长柔毛。花萼 5 裂至近基部,裂片相等,线形,长 6—8 毫米,外面被长柔毛,内面无毛,全缘。花冠钟状细筒形,长 2—2.3 厘米,直径约 7 毫米,外面被长柔毛至近无毛,蓝紫色;筒长 1.5—2 厘米;为檐部的 5—7 倍;檐部短,