

圆形,基部楔形,边缘具锯齿,两面密被淡褐色贴伏柔毛,下面脉微凹陷,侧脉每边4—5条;叶柄长0.7—2.4厘米,被淡褐色长柔毛。聚伞花序,2条,仅1花发育;花序梗长5—6.5厘米,被开展的锈色长柔毛;苞片2,线形,长1—1.3毫米,疏被锈色柔毛;花梗长0.7—2厘米,被锈色长柔毛。花萼5裂至基部,裂片长圆形,长2.5—3毫米,宽0.8毫米,顶端钝,全缘,被锈色长柔毛。花冠粗筒状,下方肿胀,长2—2.6厘米,直径0.7—1厘米,外面被腺状柔毛,内面下唇一侧具两条斑纹;筒长约2.1厘米;上唇长1.5毫米,微2裂,裂片长约1毫米,下唇长约5毫米,3裂至中部,裂片近圆形,长约3毫米。上雄蕊长1.4厘米,着生于距花冠基部1毫米处,下雄蕊长1.7厘米,着生于距花冠基部0.4毫米处,花丝被腺状短柔毛;退化雄蕊长1毫米,着生于花冠基部。花盘环状,高约0.5毫米。雌蕊被腺状短柔毛,长1.1厘米,子房线状长圆形,长0.9厘米,花柱长1.5毫米,柱头2,长0.5毫米。蒴果未见。

产贵州。模式标本可能采自平伐。

本种与紫花粗筒苣苔 *B. elegantissima* (Lévl. et Van.) Craib 相近缘,但植株低矮,花小,长2—2.6厘米,直径0.7—1厘米,檐部短,上唇长1.5毫米,微2裂,下唇长约5毫米,叶较小,长1—2厘米,宽0.7—1.2厘米,叶柄稍长于叶片,易与后者区别。

## 10. 筒花苣苔属\*——*Briggsiopsis* K. Y. Pan

K. Y. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **23** (3): 216. 1985.

多年生草本。根状茎粗壮。叶集生近顶,具柄;叶片卵形或近圆形;叶脉羽状。聚伞花序腋生,苞片2,对生。花萼钟状,5裂至近基部,裂片披针状线形。花较大,筒状漏斗形,白色,内面具紫色条纹,下方稍膨大;檐部二唇形,比筒短,上唇2裂至中部之下,下唇3裂至中部之下。能育雄蕊4,着生于花冠筒中部之下;花丝线形,花药基着,肾形,成对在复面顶端连着,略叉开,药室近平行,顶端不汇合;退化雄蕊1,着生于花冠上(后)方中央近基部。花盘环状,5深裂。雌蕊内藏,子房长圆形,2室,中轴胎座,上(后)方1室发育,裂片反曲,具多数胚珠,下(前)方1室退化成空腔或完全退化,花柱细,比子房长,柱头2,倒卵形。蒴果长圆形,偏斜,室背开裂不达基部;果皮薄。

1种,分布于四川中南部、云南东北部。

1. 筒花苣苔(植物分类学报) 图版58: 1—5

*Briggsiopsis delavayi* (Franch.) K. Y. Pan in *Acta Phytotax. Sin.* **23** (3): 217, fig. 1. 1985. — *Didissandra delavayi* Franch. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* **5**: 250. 1899. — *D. beauverdiana* Lévl. in *Repert. Sp. Nov.* **9**: 328. 1911. — *Briggsia* *bea-*

\* 植物分类学报, 23卷, 3期。