

1.5—2.5 毫米,下唇 3 裂,裂片宽卵形至卵形,长 2.5—4 毫米,宽 2.5—3 毫米。雄蕊 4,上雄蕊长 3—4 毫米,着生于距花冠基部 2.5 毫米处,下雄蕊长 3.5—5 毫米,着生于距花冠基部约 3.5 毫米处,花丝线形,无毛,花药长圆形,长约 0.6 毫米,药室汇合,基部极叉开;退化雄蕊长约 1 毫米,着生于距花冠基部 2 毫米处。花盘高约 0.5 毫米。雌蕊无毛,子房长圆形,长约 2 毫米,花柱与子房等长或稍短于子房,柱头头状,微凹。蒴果线形,长约 2 厘米。

花期 6 月,果期 8 月。

产云南、贵州、四川、陕西、湖北、湖南、广西、广东、山西、河南及河北等省区。生于山坡岩石上,海拔 1 000—2 300 米。模式标本采自湖北西部。

全草药用,治跌打损伤。

7. 长柄珊瑚苣苔

Corallodiscus plicatus (Franch.) Burtt in Gard. Chron III, 122(3180): 212. 1947. — *Didissandra plicata* Franch. in Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, 1: 123. 1899; Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 11:258. 260. 1919.

7a. 长柄珊瑚苣苔(原变种)

C. plicatus var. **plicatus**

多年生草本。根状茎短而粗,长约 1 厘米,直径约 6 毫米。叶全部基生,莲座状,外层叶具较长的柄;叶片革质,菱状卵形或菱状长圆形,长 1.2—1.9(—3.5) 厘米,宽 8—10(—16) 毫米,顶端钝或微尖,基部楔形,边缘具细圆齿,上面无毛,呈扇状皱褶,下面疏被短柔毛至近无毛,侧脉每边 4 条,上面下凹,下面强烈隆起,被毡毛状绵毛;叶柄长达 2 厘米,稀 1.5 厘米之下。聚伞花序 2—3 次分枝,2—3 条,每花序具 6—8 花;花序梗长 5—6 厘米,与花梗、花萼均无毛;苞片不存在;花梗长 5—10 毫米。花萼钟状,5 裂至近基部,长圆状披针形,长约 2.5 毫米,宽约 0.7 毫米,具 3 脉。花冠筒状,淡紫色,长 9.5—12 毫米,外面无毛,内面下唇一侧具两条斑纹和淡黄色髯毛,筒部长约 7 毫米,直径 3.5—4 毫米;上唇 2 裂,裂片略为三角形,长 1.5 毫米,宽不及 1 毫米,下唇 3 裂,裂片卵圆形,长约 2 毫米,宽约 1.5 毫米。雄蕊 4,上雄蕊长约 3.5 毫米,着生于距花冠基部 3 毫米处,下雄蕊长约 3 毫米,着生于距花冠基部 2.5 毫米处,花丝线形,有时卷曲;花药长圆形,长 0.6 毫米,药室汇合,基部极叉开;退化雄蕊长约 0.7 毫米,着生于距花冠基部 1.5 毫米处。花盘高 0.3 毫米。雌蕊无毛,子房长圆形,长约 3 毫米,花柱与子房近等长,柱头头状,微凹。蒴果线形,长约 1.5—1.8 厘米,直径约 2.5 毫米。花期 6—7 月。

产云南西北部、四川西南部及贵州(威宁)。生于山坡阴湿石灰岩上,海拔 1 900—2 200 米。模式标本采自云南鹤庆。

7b. 短柄珊瑚苣苔(变种) 图版 61: 5—7

C. plicatus var. **lineatus** (Craib) K. Y. Pan, stat. nov. — *Didissandra lineata* Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 11: 245. 258. 260. 1919. — *C. lineatus* (Craib)