

部被髯毛是错误的), 蒴果在成熟时狭长圆形, 顶端都具有较长的尖头, 毛被颜色随植株发育而变化: 幼时灰白色, 逐渐向淡黄色、黄褐色过渡。因此, 我们认为应把 *B. sinensis* 并入 *B. tonkinensis* 中。

2. 少毛横蒴苣苔(植物研究)

Beccarinda paucisetulosa C. Y. Wu ex H. W. Li in Bull. Bot. Res. 3(2):14, photo. 7. 1983.

多年生草本。根状茎短而粗, 长约 1.5 厘米, 直径约 1 厘米。叶全部基生, 具柄; 叶片卵形, 长 2.5—4 厘米, 宽 3—3.5 厘米, 顶端近圆形, 基部心形, 边缘具浅圆齿, 上面疏被长柔毛至近无毛, 下面被鳞片状小凸起, 脉上被柔毛, 侧脉每边 5 条; 叶柄长 2.5—4.5 厘米, 密被黄褐色长柔毛。聚伞花序伞状, 4 条, 每花序具 3—5 花; 花序梗长 8—12 厘米, 与花梗疏被黄褐色长柔毛; 苞片宽卵形, 长 4 毫米, 宽 5 毫米, 疏被长柔毛; 花梗长 3—17(12) 毫米。花萼长 5 毫米, 5 裂达基部, 裂片狭卵形, 长约 5 毫米, 宽 2.5—3 毫米, 顶端膨大状渐尖, 具 5 脉, 外面疏被长柔毛。花冠近斜钟状, 紫色, 长 9 毫米, 直径 7 毫米; 筒长 4 毫米; 上唇 2 裂, 裂片圆形, 长约 2.5 毫米, 下唇 3 裂, 裂片圆形, 长约 5 毫米。雄蕊 4, 花丝无毛, 长 3 毫米, 着生于距花冠基部 1.5 毫米处, 花药宽卵形, 长 2.5 毫米, 药室 2, 顶端汇合。花盘不明显。子房卵球形, 长 2 毫米, 花柱长 4 毫米, 柱头头状。蒴果未见。花期 5 月。

产云南金平(独家)。生于林缘路旁, 海拔 2100 米。

3. 饰岩横蒴苣苔(植物研究) 图版 63: 1—4

Beccarinda argentea (Anthony) Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. 22: 63. 1955; H. W. Li in Bull. Bot. Res. 3(2): 16. 1983. — *Petrodora argentea* Anthony in Not. Bot Gard. Edinb. 18: 203. 1934.

多年生草本。根状茎长 3—7 厘米, 直径 5—7 毫米。叶全部基生, 具长柄; 叶片椭圆形或卵状椭圆形, 长 3.5—7.5 厘米, 宽 1.5—4.5 厘米, 顶端圆形, 基部圆形或宽楔形, 边缘具浅圆齿, 两面被白色贴伏长柔毛, 下面脉上更为密集; 叶柄长 2—6 厘米, 密被淡黄色长柔毛。聚伞花序, 1—3 条, 每花序具 1—3 花; 花序梗长 8—10 厘米, 疏生淡黄色长柔毛; 苞片卵形或宽卵形, 长 4—6 毫米, 宽 3—4 毫米, 被白色或黄褐色长柔毛; 花梗长约 1 厘米。花萼 5 裂至基部, 裂片近相等, 卵形长 3—4 毫米, 宽 1.2—1.5 毫米, 外面被白色长柔毛, 内面近无毛。花冠近斜钟状, 长 1.2—1.8 厘米, 直径 8—10 毫米, 紫色、紫红色, 外面被疏柔毛; 筒长约 6 毫米; 上唇长 5 毫米, 2 深裂, 裂片相等, 近圆形, 长约 3.5 毫米, 宽约 3 毫米, 下唇长约 11 毫米, 3 裂至近中部, 裂片圆形; 中央裂片长约 6 毫米, 侧裂片长约 3 毫米。雄蕊 4, 近无毛, 着生于花冠近基部, 花丝弯曲, 长约 3 毫米, 花药卵圆形, 全部连着, 长约 1.4 毫米, 2 室, 顶端汇合, 横缝开裂。花盘高 0.4 毫米。雌蕊无毛, 子房卵球形, 长约 2 毫米, 直径约 1.2 毫米, 花柱长约 6 毫米, 柱头头状。蒴果长圆形, 长 2.5—3 厘米, 直径 2—3 毫米。花期 3 月。