

4. 无毛, 花丝细, 长 2.5—3 毫米, 着生于花冠近基部, 花药长 0.5 毫米, 顶端全部连着, 药室 2, 顶端汇合; 退化雄蕊长 0.5 毫米, 着生于具花冠基部 1 毫米处。花盘高 0.3 毫米。雌蕊被疏柔毛, 子房卵球形, 长 1 毫米, 直径 0.8 毫米, 花柱细, 长 3 毫米, 柱头头状。蒴果狭长圆形, 长 8—10 毫米, 直径约 2 毫米。种子小, 长 0.3 毫米, 黑褐色, 表面具网状纹饰。花期 5 月。

产广西东部。生于阴湿的石灰岩石壁上, 海拔 400—1180 米。模式标本采自金秀。

本种与横蒴苣苔 *B. tonkinensis* (Pellegr.) Burtt 区别在于叶片小, 椭圆形, 长 1—3.5 厘米, 宽 0.6—2 厘米, 边缘具浅圆齿, 花序梗较短, 长 2—4 厘米, 雌蕊被疏柔毛。

16. 细蒴苣苔属*——*Leptoboea* Benth.

Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 1025. 1876, ut *Leptoboea*; Clarke in A. DC. Monogr. Phan. 5: 164. 1883; W. T. Wang et K. Y. Pan in Bull. Bot. Res. 2(2): 123. 1982. —*Championia* Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. 98. 1874, non Gard. 1846.

亚灌木。茎分枝和叶均对生; 叶具短柄, 常密集于当年生短枝上。聚伞花序伞状, 花序梗和花梗均细如丝状; 苞片 2。花萼钟状, 5 裂至近基部。花冠小, 钟状, 檐部不明显二唇形, 5 裂片近相等, 筒稍长于檐部。能育雄蕊 4, 内藏, 分生, 药室 2, 略叉开, 顶端药隔不融合; 退化雄蕊 1。无花盘。子房椭圆形, 稍长于花柱, 柱头 1, 不裂。蒴果室间开裂。种子多数, 细小, 无毛。

本属约 3 种, 分布于我国云南, 以及缅甸、印度东北部、不丹、锡金及加里曼丹。我国有 1 种, 分布于云南南部及西南部。

本属与短筒苣苔属 *Boeica* Clarke 相近缘, 但后者叶互生, 花冠筒部比檐部短, 药室顶端汇合, 蒴果室背开裂, 有别于细蒴苣苔属。

1. 细蒴苣苔(植物研究) 图版 64: 6—10

Leptoboea multiflora (Clarke) Clarke in A. DC. Monogr. Phan. 5: 165. 1883; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 368. 1884; W. T. Wang et K. Y. Pan in Bull. Bot. Res. 2(2): 124. 1982. —*Championia multiflora* Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. 98, tab. 68. 1872.

亚灌木。茎高 1—2 米, 无毛, 分枝对生, 当年生分枝常缩短, 具柔毛。叶对生, 具短

* 植物研究, 2 卷 2 期。