

面无毛;花梗长 1.5—4 毫米,被柔毛。花萼 5 裂达基部,裂片线形,长约 2.5 毫米,宽 0.8—1 毫米,顶端微钝,边缘上部有 1—2 小齿,外面被柔毛,内面无毛。花冠淡紫色,长约 15 毫米,外面疏被短柔毛,内面无毛;筒近筒状,长约 12 毫米,中部之上稍变粗,口部直径约 3 毫米;上唇长约 2.5 毫米,2 深裂,裂片狭三角形,顶端渐尖,每侧有 1 三角形小裂片,下唇长约 3 毫米,3 深裂,裂片卵形,每侧各有 3—4 狭三角形小裂片。雄蕊 2,无毛,花丝与退化雄蕊着生于距花冠基部 4 毫米处,狭线形,长约 3.8 毫米,花药近肾形,长约 0.8 毫米;退化雄蕊 2,狭线形,长约 3 毫米,无毛。花盘环状,高约 0.4 毫米。雌蕊长约 10 毫米,无毛,子房线形,长 6 毫米,粗约 0.6 毫米,花柱细,长 4 毫米,顶端增粗而形成点状柱头。花期 4—5 月。

特产广西大新。生于山谷林中石上,海拔 740—910 米。

20. 瑶山苣苔属*——*Dayaoshania* W. T. Wang

W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 21(3):319. 1983.

多年生小草本;根状茎近圆柱形。叶均基生,具长或短柄,近圆形或卵形,具羽状脉。聚伞花序腋生,有 2 苞片及 1—2 花;花中等大。花萼钟状,5 裂达基部,裂片狭三角形。花冠淡紫色或白色,近钟状,筒与檐部近等长,檐部二唇形,上唇 2 裂,下唇与上唇近等长,(2—)3 裂。下(前)方(1—)2 枚雄蕊能育,稍伸出,分生,花丝着生于花冠近基部处,狭线形,有 1 脉,花药背着,长圆形,药室平行,纵裂,顶端不汇合;退化雄蕊 2 或不存在,位于上(后)方,狭线形,小。花盘环状。雌蕊稍伸出,子房线形,2 侧膜胎座稍向子房室内伸,不分裂,生有胚珠,花柱纤细,柱头 2,小。蒴果线形。种子不详。

1 种,产广西。

1. 瑶山苣苔(植物分类学报) 图版 71: 1—6

Dayaoshania cotinifolia W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 21(3): 320, fig. 1: 1—6. 1983.

多年生草本。根状茎近圆柱形,顶端粗约 7 毫米。叶 9—17 枚,均基生;叶片纸质,宽椭圆形、圆卵形或近圆形,长 2.5—5.5 厘米,宽 2.3—4.8 厘米,顶端微尖、钝或圆形,基部稍斜,圆形或宽楔形,偶尔浅心形,边缘近全缘或有不明显小浅钝齿,两面稍密被白色短柔毛,侧脉每侧 4—7 条,下面稍隆起;叶柄长 0.8—6 厘米,密被贴伏短柔毛。聚伞花序 2—4 条,每花序有 1—2 花;花序梗长 5.5—8.5 厘米,与花梗均密被短柔毛;苞片对生,线状披针形,长 5.5—9 毫米,宽 1.2—2.2 毫米,密被短柔毛;花梗长 4—12 毫米。花萼 5 全裂,裂片狭三角形或披针状线形,长 5—8 毫米,宽 1.2—2 毫米,边缘近全缘或有少数小齿,有 3 条

* 植物分类学报,21卷3期。