

脉,外面稍密被短柔毛,内面只在上部疏被短柔毛。花冠淡紫色或白色,长 1.3—1.9 厘米,外面疏被短柔毛;筒长 7—9 毫米,口部直径 5—9 毫米,内面疏被短柔毛;檐部直径 1—2 厘米,上唇长 7—10 毫米,2 裂,裂片宽卵形或圆卵形,宽 6—10 毫米,下唇长 7—12 毫米,(2—)3 裂近中部,裂片三角形,宽 2—6 毫米,边缘有短柔毛。雄蕊(1—)2;花丝着生于距花冠基部 1.8—2 毫米处,狭线形,长 7.5—14 毫米,疏被短柔毛,花药暗紫色,长圆形,长 2—3 毫米,无毛;退化雄蕊 2 或不存在,狭线形,长约 4 毫米,被短柔毛。花盘环状,高约 1 毫米。雌蕊长 1—1.6 厘米,子房线形,长 4.5—9 毫米,密被短柔毛,花柱疏被短柔毛,柱头半圆形或宽卵形,宽约 0.6 毫米。幼果线形,长约 2.5 厘米,被短柔毛。花期 9 月。

产广西金秀大瑶山。生于山地林中或路边林下,海拔 860—1 200 米。

21. 双片苣苣属*——*Didymostigma* W. T. Wang

W. T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.* **22**(3): 188. 1984.

一年生草本,具茎。叶对生,具柄,卵形,叶脉羽状。聚伞花序腋生,具梗;苞片对生,小;花中等大。花萼狭钟状,5 裂达基部,裂片狭披针状条形。花冠淡紫色,筒细漏斗状,檐部二唇形,比筒短,上唇 2 浅裂,下唇 3 浅裂。下(前)方 2 雄蕊能育,着生于花冠筒中部之上,花丝近直,狭线形,全长近等宽,具 1 脉,花药椭圆球形,基着,顶端连着,药室平行,顶端不汇合;退化雄蕊 2,小,狭线形,顶端稍变粗。花盘环状。雌蕊内藏,子房线形,侧膜胎座 2,稍向内伸即极叉开,生有胚珠,花柱细,柱头 2,等大。蒴果线形,室背纵裂。种子椭圆形,多少光滑。

1 种,分布于我国广东和福建南部。

1. 双片苣苣(植物分类学报) 唇柱苣苣(中国高等植物图鉴) 图版 72

Didymostigma obtusum (Clarke) W. T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.* **22**(3): 189. fig. 2. 1984. — *Chirita obtusa* Clarke in A. DC. *Monogr. Phan.* **5**: 114. 1883; Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **26**: 232. 1890; Wood in *Not. Bot. Gard. Edinb.* **33**(1): 160. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 136, 图 5685. 1975. — *Roettlera obtusa* (Clarke) Kuntze, *Rev. Gen.* **2**: 476. 1891. — *Didymocarpus clarkei* Lévl. in *Compt. Rend. Assoc. France* **34**: 427. 1906.

茎渐升或近直立,长 12—20 厘米,有 3—5 节,不分枝或分枝,多少密被柔毛。叶对生;叶片草质,卵形,长 2—10 厘米,宽 1.4—7 厘米,顶端微尖或微钝,基部稍斜,宽楔形或斜圆形,边缘具钝锯齿,两面被柔毛,下面毛稀疏,并常带紫红色,侧脉每侧 5—8 条;叶柄长 0.8—3.8 厘米,被柔毛。花序腋生,不分枝或 2—4 回分枝,有 2—10 花;花序梗长 1.5—

* 植物分类学报, 22 卷 3 期。