

Hemiboea omeiensis W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 2 (2): 127. 1982.

多年生草本。茎上升,高 30—45 厘米,无毛,不分枝,具 3—4 节。叶对生;叶片稍肉质,干时草质,长圆形或椭圆形,长 8—19 厘米,宽 4—8.8 厘米,顶端渐尖,基部斜宽楔形至楔形,或一侧楔形,另一侧圆形,近全缘或中部以上浅波状或有浅钝齿,上面深绿色,疏被贴伏的短柔毛,下面淡绿色,无毛;蠕虫状石细胞嵌生于维管束周围的基本组织中;侧脉每侧 8—10 条,与中脉成直角或钝角;叶柄长 0.3—3.5 厘米,无毛。聚伞花序假顶生;花序梗长 2—3 厘米,无毛,具 3—6 花;总苞球形,直径 1.5—2.5 厘米,无毛,开放后呈船形;花梗长 1—4 毫米,无毛。萼片 5,线状披针形,长 1.5—1.8 厘米,宽 2.5—3.5(—4)毫米,顶端微钝,白色。花冠白色,具紫斑,长 3—4 厘米,外面疏被腺状短柔毛,内面在距基部 4—5 毫米处有一毛环;筒长 2.3—3.2 厘米,口部直径 1.2—1.4 厘米,基部上方直径 5—6 毫米;上唇长 8—10 毫米,2 浅裂,裂片卵圆形,下唇长 10—13 毫米,3 深裂,裂片长圆形。雄蕊:花丝着生于距花冠基部 8—10 毫米处,狭线形,长 13—14 毫米,花药长圆形,长 3.5—4 毫米,顶端连着;退化雄蕊 3,侧面 2 个长 5—7 毫米,顶端小头状,中央 1 个长 4 毫米。花盘环状,高 1—1.2 厘米。雌蕊长 2—2.5 厘米,子房线形,无毛,花柱被短腺毛,柱头近截形。蒴果线状披针形,长 3—3.3 厘米,宽 2.5 毫米,无毛。花期 8—10 月,果期 11—12 月。

产四川西部的峨眉和天全。生于海拔 850—1 900 米的林缘沟旁。模式标本采自峨眉山。

全草药用,治疗痢。

7. **降龙草**(中国高等植物图鉴) 马拐、牛耳朵(广西),水泡菜(云南),散血毒莲、虎山叶、雪汀菜(贵州),白雌雄草、山兰(浙江),秤杆蛇药(湖南),降蛇草(湖北)

Hemiboea subcapitata Clarke in Hook. Icon. Pl. 18: sub pl. 1798. 1888; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 887. 1936; 中国高等植物图鉴 4: 135, 图 5683. 1975. —*H. marmorata* Lévl. in Repert. Sp. Nov. 9: 454. 1911.

7a. **降龙草**(原变种) 图版 78: 6—8

H. subcapitata var. **subcapitata**

多年生草本。茎高 10—40 厘米,肉质,无毛或疏生白色短柔毛,散生紫褐色斑点,不分枝,具 4—7 节。叶对生;叶片稍肉质,干时草质,椭圆形、卵状披针形或倒卵状披针形,长 3—22 厘米,宽 1.4—8 厘米,全缘或中部以上具浅钝齿,顶端急尖或渐尖,基部楔形或下延,常不相等,上面散生短柔毛或近无毛,深绿色,背面无毛或沿脉疏生短柔毛,淡绿色或紫红色;皮下散生蠕虫状石细胞;侧脉每侧 5—6 条;叶柄长 0.5—5.5 厘米。聚伞花序腋生或假顶生,具(1—)3—10 余花;花序梗长 2—4(—13)厘米,无毛;总苞球形,直径 1.5—2.2 厘米,顶端具突尖,无毛,开裂后呈船形;花梗粗壮,长 2—5 毫米,无毛。萼片 5,长椭圆形,长 6—9 毫米,宽 3—4 毫米,无毛,干时膜质。花冠白色,具紫斑,长 3.5—4.2 厘米;花冠筒长 2.8—3.5 厘米,外面疏生腺状短柔毛,内面基部上方 5—6 毫米处有一毛环。口部直径 13