

46. 1985.

多年生草本。根状茎短，长约 1 厘米，粗 8 毫米。叶约 6，均基生；叶片纸质，卵形或椭圆状卵形，长 6.5—13 厘米，宽 3.8—7 厘米，顶端钝，基部宽楔形，边缘有钝牙齿或浅牙齿，两面被疏柔毛，侧脉每侧 4—5 条；叶柄长 2.8—8 厘米，扁，宽 2.5—6 毫米，被疏柔毛。花序 3—4 条，2 回分枝，每花序有 6—12 花；花序梗长 10—13 厘米，被开展短柔毛；苞片对生，宽卵形或近圆形，长 9—11 毫米，宽 7 毫米，边缘有浅齿，疏被短柔毛；花梗长 3—7 毫米，密被短腺毛。花萼长 4—5 毫米，5 裂达基部；裂片线形，宽 1.5—2 毫米，顶端钝，边缘中部之上每侧有 1—2 小齿，外面密被短腺毛，内面上部被疏柔毛。花冠蓝色，长约 3.5 厘米，外面被短腺毛，内面下部被疏柔毛；筒近筒状，长 2.7 厘米，口部直径 8 毫米；上唇长 7 毫米，2 浅裂，下唇长 11 毫米，3 裂至中部。雄蕊的花丝着生于距花冠基部 14 毫米处，长 11 毫米，被疏短腺毛，在基部之上膝状弯曲，花药长 4 毫米，边缘有短柔毛；退化雄蕊 2，披针状狭线形，长 4—7 毫米，被疏柔毛，顶端有小的空花药。花盘环状，高约 0.8 毫米。雌蕊长约 2.9 厘米，子房长 1.5 厘米，宽 1.5 毫米，与花柱均密被短柔毛及短腺毛，柱头线形，长 3 毫米，顶端微凹。花期 6 月。

产贵州梵净山。生于山谷沟边林下，海拔 1 000 米。


21. 来凤唇柱苣苔(植物研究) 图版 89: 19

Chirita laifengensis W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 4(1): 17, pl. 2: 6—8. 1984 et 5(3): 46. 1985.

多年生草本。根状茎长约 1.9 厘米，顶部粗约 7 毫米。叶约 5，均基生，具长或短柄；叶片纸质，卵形、宽卵形或椭圆形，长 2.7—4.2 厘米，宽 1.9—3.3 厘米，顶端微钝或钝，基部宽楔形或近截形，常稍斜，边缘有浅钝齿或小牙齿，两面被柔毛，侧脉每侧约 3 条；叶柄长 0.8—2.4 厘米，扁平，被柔毛。花序约 4 条，一回分枝，每花序有 1—3 花；花序梗长 4—8.5 厘米，被短和长柔毛；苞片对生，狭卵形、长圆形或倒卵形，长 4—6 毫米，宽 2.7—4 毫米，顶端钝，全缘或有小齿，被短柔毛；花梗长 0.7—1.1 厘米，密被短腺毛。花萼 5 裂达基部，裂片线形，长约 4 毫米，宽 1.2—1.5 毫米，边缘上部有 1—2 小齿，外面被短柔毛。花冠紫色，长约 3.6 厘米，外面被短柔毛，内面近无毛；筒漏斗状筒形，长约 2.5 厘米，口部直径 9 毫米；上唇长约 6 毫米，2 深裂，下唇长约 12 毫米，3 裂，裂片顶端圆截形。雄蕊的花丝及退化雄蕊着生于距花冠基部 1.3 厘米处，长约 1.4 厘米，下部宽 0.8 毫米，上部宽 0.3 毫米，在中部膝状弯曲，顶部有黑色小腺体，花药长约 2.5 毫米，两端被疏柔毛；退化雄蕊 2，披针状钻形，长约 3.5 毫米，顶端头状。花盘环状，高约 0.8 毫米。雌蕊长约 2.8 厘米，子房线形，长 11 毫米，宽 1.2 毫米，被稍密的短柔毛，花柱被疏柔毛，柱头长约 2 毫米，宽 1 毫米，顶端 2 浅裂。花期 6 月。

产湖北来凤。生于山地岩石上，海拔 900 米。

22. 多萼唇柱苣苔(植物研究) 图版 89: 20, 图版 97: 1—2



- 柱头 1. 钟冠唇柱苣苔 *Chirita swinglei* (Merr.) W. T. Wang。2. 钻萼唇柱苣苔 *C. subulatisepala* W. T. Wang。3. 短唇柱苣苔 *C. brachystigma* W. T. Wang。4. 紫萼唇柱苣苔 *C. atropurpurea* W. T. Wang。5. 芥状唇柱苣苔 *C. brassicoides* W. T. Wang。6. 薄叶唇柱苣苔 *C. tenuifolia* W. T. Wang。7. 舌状唇柱苣苔 *C. liguliformis* W. T. Wang。8. 疏花唇柱苣苔 *C. laxiflora* W. T. Wang。9. 黄斑唇柱苣苔 *C. flavimaculata* W. T. Wang。10. 多花唇柱苣苔 *C. floribunda* W. T. Wang。11. 药用唇柱苣苔 *C. medica* D. Fang ex W. T. Wang。12. 直蕊唇柱苣苔 *C. orthandra* W. T. Wang。13. 四川唇柱苣苔 *C. sichuanensis* W. T. Wang。14. 牛耳朵 *C. eburnea* Hance。15. 连县唇柱苣苔 *C. lienxienensis* W. T. Wang。16. 隆林唇柱苣苔 *C. lunglinensis* W. T. Wang。17. 龙州唇柱苣苔 *C. lungzhouensis* W. T. Wang。18. 钝齿唇柱苣苔 *C. obtusidentata* W. T. Wang。19. 来凤唇柱苣苔 *C. laifengensis* W. T. Wang。20. 多革唇柱苣苔 *C. polycephala* (Chun) W. T. Wang。21. 三苞唇柱苣苔 *C. tribracteata* W. T. Wang。22. 蝙蝠七 *C. fimbriiseptala* Hand.-Mazz.。23. 零陵唇柱苣苔 *C. linglingensis* W. T. Wang。24. 桂林唇柱苣苔 *C. gueilensis* W. T. Wang。25. 烟叶唇柱苣苔 *C. heterotricha* Merr.。26. 桂粤唇柱苣苔 *C. fordii* (Hemsl.) Wood.。27. 长柱唇柱苣苔 *C. longistyla* W. T. Wang。28. 肉叶唇柱苣苔 *C. carnosifolia* C. Y. Wu ex H. W. Li。29. 粉花唇柱苣苔 *C. rosealba* W. T. Wang。30. 齿萼唇柱苣苔 *C. verecunda* (Chun) W. T. Wang。31. 翅柄唇柱苣苔 *C. pteropoda* W. T. Wang。32. 大齿唇柱苣苔 *C. juliae* Hance。33. 硬叶唇柱苣苔 *C. sclerophylla* W. T. Wang。34. 莓叶唇柱苣苔 *C. subrhomboidea* W. T. Wang。35. 卵圆唇柱苣苔 *C. rotundifolia* (Hemsl.) Wood.。36. 小叶唇柱苣苔 *C. parvifolia* W. T. Wang。37. 二色唇柱苣苔 *C. bicolor* W. T. Wang。38. 红药 *C. longgangensis* var. *hongyao* S. Z. Huang.。39. 线叶唇柱苣苔 *C. linearifolia* W. T. Wang.。（王文采绘）