

11—13 毫米, 宽 2.2—3 毫米, 两面被短糙伏毛; 花梗长 1—2.5 厘米, 被短柔毛及短腺毛。花萼长 4—6 毫米, 5 裂至基部; 裂片线状披针形, 宽 0.8—1 毫米, 外面被短柔毛及短腺毛, 内面无毛。花冠白色带粉红色, 长约 4 厘米, 外面及内面上唇有少数短柔毛; 筒漏斗状筒形, 长约 2.4 厘米, 口部粗约 1.2 厘米; 上唇长约 7 毫米, 2 浅裂, 下唇长约 15 毫米。雄蕊的花丝着生于距花冠基部 16 毫米处, 长约 11 毫米, 在基部之上膝状弯曲, 下部有疏柔毛, 上部有少数腺毛, 花药长约 3 毫米, 被疏柔毛; 退化雄蕊 2, 着生于距花冠基部 14 毫米处, 狹线形, 长约 6 毫米, 弧状弯曲, 有极疏腺毛。花盘环状, 高约 0.8 毫米。雌蕊长约 2.8 厘米, 子房粗约 1 毫米, 密被短柔毛, 花柱被短腺毛, 柱头长约 2 毫米, 2 裂。花期 7 月。

产湖南大庸。生于山谷溪边灌丛中。

37. 翅柄唇柱苣苔(植物研究) 图版 89: 31, 图版 95: 6—10

Chirita pteropoda W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 5(3):51, pl. 1, fig. 6—10. 1985.


多年生草本。根状茎圆柱形, 分枝, 粗达 2.5 厘米。叶约 5 对密集于根状茎顶端; 叶片纸质, 椭圆状卵形或椭圆形, 长 6—24 厘米, 宽 4.4—16 厘米, 顶端钝或微尖, 基部宽楔形, 下延成叶柄的宽翅, 边缘有浅波状小齿, 两面被疏柔毛, 侧脉每侧约 6 条, 下面隆起; 叶柄扁, 长 1.4—8 厘米, 宽 0.8—3 厘米。花序腋生, 2—3 回分枝, 有 5—19 花; 花序梗长 15—30 厘米, 被短腺毛及疏柔毛; 苞片对生, 披针形或狭披针形, 长 10—11 毫米, 宽 2.5—4 毫米; 花梗长 1—3.8 厘米, 有腺毛。花萼红紫色, 长 1—1.2 厘米, 5 裂达或近基部, 裂片披针状线形, 宽 2 毫米, 外面被柔毛和短腺毛。花冠白色带淡紫色, 在上唇之下有 1 紫斑, 长 3.6—4 厘米, 外面及内面紫斑上被短腺毛; 筒长 2.5—2.8 厘米, 口部直径 1 厘米; 上唇长 4.5—6 毫米, 2 裂至中部, 下唇长 1.1—1.2 厘米, 3 浅裂。雄蕊花丝着生于距花冠基部 1.4 厘米处, 长约 1.2 厘米, 膝状弯曲, 被短腺毛, 花药长约 2 毫米, 无毛; 退化雄蕊 3, 侧生的长 4.5—5 毫米, 中央的长 0.5 毫米。花盘环状, 高 1 毫米。雌蕊长 2.2—2.5 厘米, 密被短腺毛, 子房长 1.3—1.6 厘米, 柱头狭匙形, 长 2 毫米, 顶端微 2 裂。花期 11 月。

在广州中国科学院华南植物研究所植物园栽培, 可能引种自广西。


38. 大齿唇柱苣苔(植物研究) 图版 89: 32, 图版 91: 1—2(见 345 页)

Chirita juliae Hance in Journ. Bot. 21: 168. 1883; Wood in Not. Bot. Gard. Edinb. 33(1): 143. 1974; W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 5(3):52. 1985.—*Roettlera juliae* (Hance) Kuntze, Rev. Gen. 2: 476. 1891.—*Didymocarpus juliae* (Hance) Lévl. in Compt. Rend. Assoc. France 34:427. 1906.—*Chirita mangshanensis* W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(4): 49. 1981.—*C. mangshanensis* var. *lesiantha* W. T. Wang, l. c. 4(1): 15. 1984.

多年生草本。根状茎长 2—3 厘米, 粗约 1 厘米。叶基生, 具长或短柄; 叶片革质或薄革质, 卵形、椭圆状卵形或椭圆形, 长 6—15 厘米, 宽 4.4—9 厘米, 顶端微尖或钝, 基部楔



柱头 1. 钟冠唇柱苣苔 *Chirita swinglei* (Merr.) W. T. Wang。2. 钻萼唇柱苣苔 *C. subulatisepala* W. T. Wang。3. 短唇柱苣苔 *C. brachystigma* W. T. Wang。4. 紫萼唇柱苣苔 *C. atropurpurea* W. T. Wang。5. 芥状唇柱苣苔 *C. brassicoides* W. T. Wang。6. 薄叶唇柱苣苔 *C. tenuifolia* W. T. Wang。7. 舌状唇柱苣苔 *C. liguliformis* W. T. Wang。8. 疏花唇柱苣苔 *C. laxiflora* W. T. Wang。9. 黄斑唇柱苣苔 *C. flavimaculata* W. T. Wang。10. 多花唇柱苣苔 *C. floribunda* W. T. Wang。11. 药用唇柱苣苔 *C. medica* D. Fang ex W. T. Wang。12. 直蕊唇柱苣苔 *C. orthandra* W. T. Wang。13. 四川唇柱苣苔 *C. sichuanensis* W. T. Wang。14. 牛耳朵 *C. eburnea* Hance。15. 连县唇柱苣苔 *C. lienxienensis* W. T. Wang。16. 隆林唇柱苣苔 *C. lunglinensis* W. T. Wang。17. 龙州唇柱苣苔 *C. lungzhouensis* W. T. Wang。18. 钝齿唇柱苣苔 *C. obtusidentata* W. T. Wang。19. 来凤唇柱苣苔 *C. laifengensis* W. T. Wang。20. 多革唇柱苣苔 *C. polypephala* (Chun) W. T. Wang。21. 三苞唇柱苣苔 *C. tribracteata* W. T. Wang。22. 蝙蝠七 *C. fimbriiseptala* Hand.-Mazz.。23. 零陵唇柱苣苔 *C. linglingensis* W. T. Wang。24. 桂林唇柱苣苔 *C. gueilensis* W. T. Wang。25. 烟叶唇柱苣苔 *C. heterotricha* Merr.。26. 桂粤唇柱苣苔 *C. fordii* (Hemsl.) Wood.。27. 长柱唇柱苣苔 *C. longistyla* W. T. Wang。28. 肉叶唇柱苣苔 *C. carnosifolia* C. Y. Wu ex H. W. Li。29. 粉花唇柱苣苔 *C. rosealba* W. T. Wang。30. 齿萼唇柱苣苔 *C. verecunda* (Chun) W. T. Wang。31. 翅柄唇柱苣苔 *C. pteropoda* W. T. Wang。32. 大齿唇柱苣苔 *C. juliae* Hance。33. 硬叶唇柱苣苔 *C. sclerophylla* W. T. Wang。34. 莓叶唇柱苣苔 *C. subrhomboidea* W. T. Wang。35. 卵圆唇柱苣苔 *C. rotundifolia* (Hemsl.) Wood.。36. 小叶唇柱苣苔 *C. parvifolia* W. T. Wang。37. 二色唇柱苣苔 *C. bicolor* W. T. Wang。38. 红药 *C. longgangensis* var. *hongyao* S. Z. Huang.。39. 线叶唇柱苣苔 *C. linearifolia* W. T. Wang. (王文采绘)



1—5. 黄斑唇柱苣苔 *Chirita flavimaculata* W. T. Wang: 1. 叶, 2. 花序, 3. 花盘及雌蕊, 4. 柱头, 5. 子房横切面。6—10. 翅柄唇柱苣苔 *C. pteropoda* W. T. Wang: 6. 叶, 7. 花序, 8. 花冠打开, 9. 柱头, 10. 子房横切面。(刘春荣绘)