

形，长约 6 毫米，宽 0.8 毫米，外面被短柔毛。花冠紫色，长约 2.8 厘米，外面疏被短柔毛，内面上部及下部疏被短柔毛；筒漏斗状筒形，长约 1.9 厘米，口部直径 7 毫米；上唇长 4 毫米，2 裂近中部，裂片圆卵形，下唇长 8 毫米，3 裂至中部，侧裂片圆卵形，中裂片长圆形。雄蕊花丝着生于距花冠基部 10 毫米处，长 11 毫米，中部之下膝状弯曲，向上渐变狭，边缘疏被短腺毛，花药长圆形，长 2.8 毫米，背面有髯毛；退化雄蕊 2，狭线形，长约 6 毫米，近无毛。花盘环状，高 1.2 毫米。雌蕊长约 2.3 厘米，子房线形，长 1.5 厘米，宽 1.2 毫米，密被短柔毛，柱头长 3 厘米，宽 1.2 毫米，2 浅裂，裂片长圆状卵形。花期 5 月。

产贵州荔波。生于山谷林下阴处石上，海拔 850 米。

44. **菱叶唇柱苣苔**(植物研究) 图版 89: 34, 图版 100: 3—5

Chirita subrhomboidea W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(4):47, photo. 5. 1981 et 5(3):58. 1985.

多年生草本。根状茎长约 3.5 厘米，粗约 1.8 厘米。叶均基生；叶片革质，菱状卵形、椭圆形、宽椭圆形或匙形，两侧稍不对称，长 3—7 厘米，宽 1.5—3.7 厘米，顶端圆形或钝，基部楔形或宽楔形，边缘浅波状或近全缘，密被睫毛，上面疏被短糙伏毛，下面被疏柔毛，侧脉每侧约 3 条，不明显；叶柄长达 2.5 厘米，被长柔毛。花序有 1—3 花；花序梗长 5.5—8 厘米，密被紫色短柔毛；苞片对生，紫色，狭卵形或三角形，长 4—6 毫米，宽 2—3 毫米，两面被短柔毛；花梗长 8—14 毫米，密被柔毛。花萼紫色，长 6—7 毫米，5 裂至基部；裂片狭披针形，宽 1.2—2 毫米，边缘近顶部有 1—2 小齿，外面被短柔毛，内面近无毛。花冠紫色，长约 4.5 厘米，外面被极短柔毛，内面下部及上唇之下有短柔毛；筒细漏斗状，长约 3 厘米，口部粗 1.4 厘米；上唇长约 9 毫米，下唇长约 15 毫米。雄蕊的花丝与退化雄蕊均着生于距花冠基部 10 毫米处，长约 12 毫米，中部之下膝状弯曲，上部有少数极短柔毛，花药长约 3.5 毫米，背面被长柔毛；退化雄蕊 2，狭线形，长约 7 毫米，密被短柔毛。花盘环状，高约 0.5 毫米，边缘有浅齿。雌蕊长约 3.3 厘米，子房及花柱密被短柔毛，柱头长约 4 毫米，二深裂，裂片狭三角形。

产广西桂林。

45. **卵圆唇柱苣苔**(植物研究) 图版 89: 35

Chirita rotundifolia (Hemsl.) Wood in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 371. 1972 et 33(1): 138. 1974; W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 5(3):58. 1985. — *Didymocarpus rotundifolius* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26:230. 1890.

多年生草本。根状茎粗约 0.8 毫米。叶均基生；叶片革质，圆卵形或圆肾形，长 1.6—4.9 厘米，宽 1.6—5.3 厘米，顶端圆形，基部浅心形，边缘全缘，两面均被柔毛，侧脉每侧 3—4 条；叶柄扁，长达 4.5 厘米，被柔毛。花序 1—6 条，每花序有 2—7 花；花序梗长 4.5—13 厘米，被柔毛；苞片对生，狭三角形，长 4—5 毫米，宽 0.8—1 毫米，外面被短柔毛，内面近无毛；花梗长 1.7—7 厘米，被腺毛及柔毛。花萼长 4—5 毫米，5 裂至基部，裂片披针状

线形，宽约 1 毫米，被柔毛。花冠紫色，长 2.3—2.6 厘米，外面疏被短柔毛，内面在上部有柔毛；筒长约 1.2 厘米，口部粗 0.8 厘米；上唇长约 5 毫米，下唇长约 7 毫米。雄蕊的花丝着生于距花冠基部 7 毫米处，长约 7 毫米，在基部之上膝状弯曲，上部有腺体，花药长约 2 毫米，无毛；退化雄蕊着生于距花冠基部 6 毫米处，长约 3 毫米，无毛。花盘杯状，高约 0.4 毫米，不明显浅裂。雌蕊长 1.2—1.6 厘米，密被短腺毛，柱头长约 1 毫米，二浅裂。蒴果长约 3.5 厘米，宽约 2 毫米，被柔毛。

产广东北部。

46. 小叶唇柱苣苔(植物研究) 图版 89: 36, 图版 93: 3—5(见 348 页)

Chirita parvifolia W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(4):50, fig. 6—8. 1981 et 5(3):59. 1985.

多年生小草本。根状茎长 5 厘米以上，粗约 1 厘米。叶均基生；叶片干时革质，宽椭圆形，两侧稍不等，长 1.7—3 厘米，宽 1.3—1.9 厘米，两端圆形，边缘全缘，两面密被淡褐色贴伏短柔毛(毛长 0.2—0.8 毫米)，脉不明显；叶柄长 1—1.4 厘米，扁，宽约 1.2 毫米，有极密短柔毛。花序 2 条，每花序具 1 花；花序梗长 5.3—5.6 厘米，密被短伏毛；苞片对生，倒卵形或椭圆形，长 8—11 毫米，宽约 4 毫米，边缘全缘，上面无毛，下面被贴伏短柔毛；花梗长约 8 毫米，密被开展的腺毛。花萼长 5—6 毫米，5 裂达基部；裂片线状披针形或披针形，宽 0.8—2.2 毫米，外面被短柔毛。花冠紫红色，长约 2.7 厘米，外面下部疏被短柔毛；筒细漏斗状，长约 1.7 厘米，口部粗 1.1 厘米；上唇长约 6 毫米，下唇长 9 毫米。雄蕊的花丝着生于距花冠基部 7 毫米处，长约 11 毫米，下部宽 1.2 毫米，被柔毛，上部宽 0.6 毫米，有稀疏短腺毛，在基部之上突膝状弯曲，花药长约 2 毫米，无毛；退化雄蕊 2，钩状，长约 5 毫米，顶端头状。花盘环状，高约 1 毫米，边缘有浅齿。雌蕊长约 2.4 厘米，子房长约 1.5 厘米，宽约 1.1 毫米，密被白色短柔毛，花柱被疏柔毛，柱头长约 1.5 毫米，2 浅裂。花期 10 月。


产广西贵县。生于石灰岩山上。

根状茎可治小儿疳积。

46'. 永福唇柱苣苔

Chirita yungfuensis W. T. Wang in Guihaia 7(2):125, cum fig. 1987.

多年生草本。基生叶约 8，有柄；叶片干时革质，椭圆形、椭圆状卵形或卵形，长(1.4—)2.3—3.2 厘米，宽(1.1—)1.7—2.4 厘米，顶端钝或微钝，基部宽楔形，边缘有浅钝齿或浅波状，上面被 0.3—4 毫米的紫色毛，下面紫色，被长 0.5—2 毫米的紫色毛，侧脉每侧 3 条，不明显；叶柄长(0.5—)1—3 厘米，扁平，有紫色长柔毛。聚伞花序约 6 条，似伞形花序，每花序有 2—4 花；花序梗长 4.5—9 厘米，有紫色长柔毛；苞片对生，卵形、狭卵形或椭圆形，长 0.7—1.2 厘米，宽 5—7 毫米，顶端微钝，背面被紫色毛；花梗长 1—1.8 厘米，密被短柔毛。花萼 5 裂达基部，裂片披针状线形或狭长圆形，长 5.5—7 毫米，宽 1.2—2.2 毫



- 柱头 1. 钟冠唇柱苣苔 *Chirita swinglei* (Merr.) W. T. Wang。2. 钻萼唇柱苣苔 *C. subulatisepala* W. T. Wang。3. 短唇柱苣苔 *C. brachystigma* W. T. Wang。4. 紫萼唇柱苣苔 *C. atropurpurea* W. T. Wang。5. 芥状唇柱苣苔 *C. brassicoides* W. T. Wang。6. 薄叶唇柱苣苔 *C. tenuifolia* W. T. Wang。7. 舌状唇柱苣苔 *C. liguliformis* W. T. Wang。8. 疏花唇柱苣苔 *C. laxiflora* W. T. Wang。9. 黄斑唇柱苣苔 *C. flavimaculata* W. T. Wang。10. 多花唇柱苣苔 *C. floribunda* W. T. Wang。11. 药用唇柱苣苔 *C. medica* D. Fang ex W. T. Wang。12. 直蕊唇柱苣苔 *C. orthandra* W. T. Wang。13. 四川唇柱苣苔 *C. sichuanensis* W. T. Wang。14. 牛耳朵 *C. eburnea* Hance。15. 连县唇柱苣苔 *C. lienxienensis* W. T. Wang。16. 隆林唇柱苣苔 *C. lunglinensis* W. T. Wang。17. 龙州唇柱苣苔 *C. lungzhouensis* W. T. Wang。18. 钝齿唇柱苣苔 *C. obtusidentata* W. T. Wang。19. 来凤唇柱苣苔 *C. laifengensis* W. T. Wang。20. 多革唇柱苣苔 *C. polycephala* (Chun) W. T. Wang。21. 三苞唇柱苣苔 *C. tribracteata* W. T. Wang。22. 蝙蝠七 *C. fimbriiseptala* Hand.-Mazz.。23. 零陵唇柱苣苔 *C. linglingensis* W. T. Wang。24. 桂林唇柱苣苔 *C. gueilensis* W. T. Wang。25. 烟叶唇柱苣苔 *C. heterotricha* Merr.。26. 桂粤唇柱苣苔 *C. fordii* (Hemsl.) Wood.。27. 长柱唇柱苣苔 *C. longistyla* W. T. Wang。28. 肉叶唇柱苣苔 *C. carnosifolia* C. Y. Wu ex H. W. Li。29. 粉花唇柱苣苔 *C. rosealba* W. T. Wang。30. 齿萼唇柱苣苔 *C. verecunda* (Chun) W. T. Wang。31. 翅柄唇柱苣苔 *C. pteropoda* W. T. Wang。32. 大齿唇柱苣苔 *C. juliae* Hance。33. 硬叶唇柱苣苔 *C. sclerophylla* W. T. Wang。34. 莓叶唇柱苣苔 *C. subrhomboidea* W. T. Wang。35. 卵圆唇柱苣苔 *C. rotundifolia* (Hemsl.) Wood.。36. 小叶唇柱苣苔 *C. parvifolia* W. T. Wang。37. 二色唇柱苣苔 *C. bicolor* W. T. Wang。38. 红药 *C. longgangensis* var. *hongyao* S. Z. Huang.。39. 线叶唇柱苣苔 *C. linearifolia* W. T. Wang.。（王文采绘）