

1(4):65. 1981 et 5(3): 63. 1985.

与蚂蝗七系相近，但花丝不或稍微膝状弯曲，花冠筒细筒状或筒状。多年生小草本。叶卵形或椭圆形，不分裂。花冠中等大或小。

54. 方氏唇柱苣苔(植物研究) 图版 90: 43

Chirita fangii W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 2(4):51. 1982 et 5(3): 63. 1985.

—*Didymocarpus fangii* Chun ex W. T. Wang, l.c., pro syn.


多年生小草本。叶约 5, 均基生; 叶片干时薄纸质, 椭圆形或卵形, 长 2.8—4 厘米, 宽 1.6—2.4 厘米, 基部楔形或圆形, 边缘有小齿, 两面均稍密被短柔毛, 侧脉每侧约 3 条; 叶柄扁, 长 1.2—3.8 厘米, 宽 1.6—2 毫米。聚伞花序 2—3 条, 每花序有 1—2 花; 花序梗长 3—5 厘米, 被短柔毛; 苞片对生, 线形, 长 2—5 毫米, 宽 0.5—1 毫米, 被短柔毛; 花梗长 4—9 毫米, 被短柔毛。花萼钟状, 长 6—7 毫米, 5 裂达基部; 裂片披针状线形, 宽约 1.4 毫米, 外面被短柔毛。花冠紫色, 长约 2.8 厘米, 外被短柔毛, 内面在檐部及花丝之下被短柔毛; 筒细筒状, 长约 2.3 厘米, 口部直径 7 毫米; 上唇长约 3.5 毫米, 2 深裂, 裂片宽卵形, 下唇长约 7 毫米, 3 裂稍超过中部, 裂片长圆形。雄蕊的花丝着生于距花冠基部 11 毫米处, 披针状狭线形, 长约 13 毫米, 在中部之下稍膝状弯曲, 无毛, 花药椭圆形, 长约 3 毫米, 背部被白色短柔毛; 退化雄蕊 3, 着生于距花冠基部 3 毫米处, 侧生 2 枚长 0.3—0.4 毫米, 无毛, 中央 1 枚长 0.2 毫米, 顶端有 1 根长毛。花盘环状, 高约 0.3 毫米。雌蕊长约 2 厘米, 子房线形, 长 7 毫米, 宽 1.7 毫米, 密被短柔毛, 花柱被短柔毛, 柱头近线形, 长 2.5 毫米, 宽 0.8 毫米, 顶端不明显 2 浅裂或微凹。花期 6 月。

产四川开县。生于山地岩石上。

55. 细筒唇柱苣苔(植物研究) 图版 90: 44

Chirita vestita Wood in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 369. 1972 et 33: 141. 1974; W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 5(3):64. 1985.—*Didymocarpus tengii* Chun ex W. T. Wang, l.c., pro syn.

多年生小草本。叶数枚, 均基生, 具柄或近无柄; 叶片薄纸质, 狹椭圆形或椭圆状匙形, 长 1.4—5.4 厘米, 宽 0.6—2.4 厘米, 顶端微尖, 基部楔形, 边缘有不明显浅波状小齿, 两面均稍密被柔毛, 侧脉每侧 3 条; 叶柄扁, 长 0.2—3 厘米。花序有 1 花; 花序梗长约 1.2 厘米, 被短柔毛; 苞片对生, 狹线形, 长 2.5—3 毫米, 宽 0.3 毫米, 被短柔毛; 花梗长 3—5 毫米。花萼狭钟状, 长 4—6 毫米, 5 裂达基部; 裂片披针状狭线形, 宽 0.5—0.9 毫米, 边缘每侧上部有 2—4 疏离小齿, 外面被短柔毛, 内面无毛。花冠紫色, 长 2.5—3.4 厘米, 外面疏被短柔毛, 内面无毛; 筒细筒状, 长约 2.1 厘米, 口部直径 3.5—5 毫米; 上唇长约 6 毫米, 2 深裂, 下唇长达 1.3 厘米, 3 裂稍超过中部, 裂片椭圆状倒卵形。雄蕊的花丝着生于距花冠基部 15 毫米处, 狹线形, 近等宽, 长约 5.5 毫米, 在基部之上稍弯曲, 疏被短腺毛, 花药椭圆形, 长 3 毫米, 无毛; 退化雄蕊 3, 着生于距花冠基部 5 毫米处, 无毛, 线形, 侧生 2 枚



柱头 40.唇柱苣苔 *Chirita sinensis* Lindl., 41.羽裂唇柱苣苔 *C. pinnatifida* (Hand.-Mazz.) Burtt,
42.复叶唇柱苣苔 *C. pinnata* W. T. Wang, 43.方氏唇柱苣苔 *C. fangii* W. T. Wang, 44.简冠唇柱苣苔 *C. vestita* Wood, 45.清镇唇柱苣苔 *C. secundiflora* (Chun) W. T. Wang, 46.神农架唇柱苣苔 *C. tenuituba* (W. T. Wang) W. T. Wang, 47.小唇柱苣苔 *C. speluncae* (Hand.-Mazz.) Wood, 48.肥牛草 *C. hedyotidea* (Chun) W. T. Wang, 49.刺齿唇柱苣苔 *C. spinulosa* D. Fang et W. T. Wang, 50.条叶唇柱苣苔 *C. ophiopogoides* D. Fang et W. T. Wang, 51.康定唇柱苣苔 *C. tibetica* (Franch.) Burtt, 52.滇川唇柱苣苔 *C. forrestii* Anthony, 53.多痕唇柱苣苔 *C. minutihamata* Wood, 54.单花唇柱苣苔 *C. monantha* W. T. Wang, 55.圆叶唇柱苣苔 *C. dielsii* (Borza) Burtt, 56.灌丛唇柱苣苔 *C. fruticola* H. W. Li, 57.光萼唇柱苣苔 *C. anachoreta* Hance, 58.角萼唇柱苣苔 *C. ceratoscyphus* Burtt, 59.麻叶唇柱苣苔 *C. urticifolia* D. Don, 60.卧茎唇柱苣苔 *C. lachenensis* Clarke, 61.长圆叶唇柱苣苔 *C. oblongifolia* (Roxb.) Sinclair, 62.大叶唇柱苣苔 *C. macrophylla* Wall., 63.斑叶唇柱苣苔 *C. pumila* D. Don, 64.合苞唇柱苣苔 *C. infundibuliformis* W. T. Wang, 65.簇花唇柱苣苔 *C. fasciculiflora* W. T. Wang, 66.钩序唇柱苣苔 *C. hamosa* R. Br. (王文采绘)