

长 0.6—1 毫米, 中央 1 枚长 0.4 毫米。花盘环状, 高 0.4 毫米。雌蕊长 2.2 厘米, 子房线状披针形, 长约 3.5 毫米, 密被短柔毛, 花柱长 14 毫米, 下部有疏柔毛, 柱头二裂, 裂片狭三角形。花期 6 月。

产贵州清镇一带。生于阴处岩石上。

56. 清镇唇柱苣苔(植物研究) 图版 90: 45

Chirita secundiflora (Chun) W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 2(4): 52. 1982 et 5(3): 64. 1985. — *Didymocarpus secundiflorus* Chun in Sunyatsenia 6(3—4): 293. 1946.


多年生小草本。根状茎短而粗, 直径 6—9 毫米。叶约 7, 均基生; 叶片干时纸质, 宽卵形、狭卵形或长椭圆形, 长 2.2—4 厘米, 宽 1.1—3 厘米, 顶端微钝或微尖, 基部楔形、宽楔形或近截形, 有时极斜, 一侧楔形, 另一侧圆形, 边缘浅波状或有不明显小齿, 上面稍密被白色贴伏长和短柔毛, 下面被短柔毛, 侧脉每侧约 3 条, 不明显; 叶柄扁, 长 1.2—3.4 厘米, 宽 1.2—4 毫米, 被长和短柔毛。花序约 5 条, 1—2 回分枝, 每花序有 1—6 花; 花序梗长 2.4—4.5 厘米, 被开展的柔毛; 苞片对生, 线形, 长 2.5—6.5 毫米, 被柔毛; 花梗长 3—7 毫米, 密被短柔毛。花萼钟状, 长约 4 毫米, 5 裂达基部, 裂片狭三角形或线状披针形, 宽 0.8—1 毫米, 边缘上部每侧有 1—2 小齿, 外面密被长柔毛, 内面被短柔毛。花冠淡紫色, 长约 2.2 厘米, 外面中部以上及内面檐部被短柔毛; 管细筒状, 长约 9 毫米, 口部直径 3.5 毫米; 上唇长 3 毫米, 2 深裂, 裂片椭圆状卵形, 下唇长约 7 毫米, 3 裂稍超过中部, 裂片长圆形。雄蕊无毛; 花丝着生于距花冠基部 5 毫米处, 近丝形, 长约 3 毫米, 在基部之上稍波状弯曲, 花药椭圆形, 长约 1.6 毫米; 退化雄蕊 3, 无毛, 侧生 2 枚着生于距花冠基部 2.5 毫米处, 镰刀形, 长 0.6—0.8 毫米, 中央 1 枚着生于距花冠基部 1.3 毫米处, 狹倒卵形, 长约 0.3 毫米。花盘环状, 高约 0.5 毫米。雌蕊长 10 毫米, 子房披针形, 长 3 毫米, 密被短柔毛, 花柱长 5 毫米, 被短柔毛, 柱头二裂近基部, 裂片狭披针形。蒴果线形, 长 7—9 毫米, 宽约 0.7 毫米。花期 5 月。

产贵州清镇。生于阴处岩石上。

57. 神农架唇柱苣苔(植物研究) 舌唇苣苔(植物研究) 图版 90: 46, 图版 92: 4—5

Chirita tenuituba (W. T. Wang) W. T. Wang, comb. nov. — *Deltocoelios tenuitubum* W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(3): 40, pl. 7, fig. 8—12. 1981. — *Chirita shennnungjiaensis* W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(4): 66, fig. 10—11. 1981 et 5(3): 64. 1985.

多年生小草本。根状茎长 5—8 毫米, 粗 3—5 毫米。叶约 5, 均基生, 具短柄; 叶片纸质, 卵形、圆卵形或近圆形, 长 1—2.5 厘米, 宽 0.8—2.5 厘米, 顶端钝, 基部宽楔形, 边缘全缘或有少数浅波状钝齿, 两面被贴伏柔毛, 侧脉每侧约 3 条; 叶柄长 3—9 毫米, 扁, 长 1—8 毫米。花序 2—4 条, 每花序有 1—3 花; 花序梗长 0.6—1.4 厘米, 与花梗均密被开展短柔



柱头 40.唇柱苣苔 *Chirita sinensis* Lindl., 41.羽裂唇柱苣苔 *C. pinnatifida* (Hand.-Mazz.) Burtt,
42.复叶唇柱苣苔 *C. pinnata* W. T. Wang, 43.方氏唇柱苣苔 *C. fangii* W. T. Wang, 44.简冠唇柱苣苔 *C. vestita* Wood, 45.清镇唇柱苣苔 *C. secundiflora* (Chun) W. T. Wang, 46.神农架唇柱苣苔 *C. tenuituba* (W. T. Wang) W. T. Wang, 47.小唇柱苣苔 *C. speluncae* (Hand.-Mazz.) Wood, 48.肥牛草 *C. hedyotidea* (Chun) W. T. Wang, 49.刺齿唇柱苣苔 *C. spinulosa* D. Fang et W. T. Wang, 50.条叶唇柱苣苔 *C. ophiopogoides* D. Fang et W. T. Wang, 51.康定唇柱苣苔 *C. tibetica* (Franch.) Burtt, 52.滇川唇柱苣苔 *C. forrestii* Anthony, 53.多痕唇柱苣苔 *C. minutihamata* Wood, 54.单花唇柱苣苔 *C. monantha* W. T. Wang, 55.圆叶唇柱苣苔 *C. dielsii* (Borza) Burtt, 56.灌丛唇柱苣苔 *C. fruticola* H. W. Li, 57.光萼唇柱苣苔 *C. anachoreta* Hance, 58.角萼唇柱苣苔 *C. ceratoscyphus* Burtt, 59.麻叶唇柱苣苔 *C. urticifolia* D. Don, 60.卧茎唇柱苣苔 *C. lachenensis* Clarke, 61.长圆叶唇柱苣苔 *C. oblongifolia* (Roxb.) Sinclair, 62.大叶唇柱苣苔 *C. macrophylla* Wall., 63.斑叶唇柱苣苔 *C. pumila* D. Don, 64.合苞唇柱苣苔 *C. infundibuliformis* W. T. Wang, 65.簇花唇柱苣苔 *C. fasciculiflora* W. T. Wang, 66.钩序唇柱苣苔 *C. hamosa* R. Br. (王文采绘)