

存 疑 种

喜荫唇柱苣苔

Chirita umbrophila C. Y. Wu ex H. W. Li in Bull. Bot. Res. **3**(2): 38, photo. 19. 1983.

多年生具茎草本。根状茎水平生长,粗达4毫米,密生须根。茎渐升,高约34厘米,被长柔毛,有3—4节,下部节间长11—18厘米,上部节间长1.5—2.5厘米。叶对生或近对生,同一对叶稍不等大,基生叶在果期不存在,茎生叶聚生于茎顶端;叶片草质,狭卵形、长圆状卵形或卵形,长6—15厘米,宽2.5—6厘米,顶端急尖,基部斜,楔形,边缘有小锯齿,上面有绿色斑,疏被长柔毛,下面颜色淡,沿中脉和侧脉疏被长柔毛,侧脉每侧6—12条,弧状渐升,近叶缘处网结,与中脉均下面较明显;叶柄长0.5—2厘米,疏被长柔毛。花情况不明。聚伞花序腋生,有1—3花,具梗,花序梗长2—5厘米,疏被长柔毛;苞片狭卵状披针形,长3—5毫米,宽1—2毫米,小苞片较小;花梗果期长0.7—1厘米,有疏柔毛。花萼钟状,长0.7—1厘米,外面被长柔毛,内面无毛,5裂达基部,裂片披针状三角形,宽1.5毫米,顶端渐尖。蒴果长圆状线形,长5.5厘米,宽3.5毫米,稍被柔毛。果期10月。

产云南镇雄。生于林中潮湿地上,海拔1650米。

模式标本(禹平华1189)为具果实的标本,其蒴果顶端的柱头已不存在,因此,暂时不能确定这种是否为属于唇柱苣苔属的植物。

33. 小花苣苔属*——**Chiritopsis** W. T. Wang

W. T. Wang in Bull. Bot. Res. **1**(3): 21. 1981.

多年生草本植物,无地上茎,具粗壮根状茎。叶均基生,具长柄,叶脉羽状。花序聚伞状,腋生,2或3回分枝,具2苞片;花小。花萼钟状,5裂达基部;裂片狭披针形。花冠白色淡黄色,或淡紫色,筒粗筒状或筒状,檐部二唇形,上唇2浅裂,下唇3深裂。下(前)方2雄蕊能育,花丝披针状线形,稍膝状弯曲,花药狭椭圆球形,腹面连着,2药室极叉开,顶端汇合;上(后)侧方退化雄蕊2,小,上(后)中方退化雄蕊多不存在,稀存在。花盘环状或间断。雄蕊稍伸出;子房卵球形,比花柱短1.5—2.5倍,2枚侧膜胎座内伸,然后反曲极叉开,具胚珠,花柱细,柱头1,片状,2浅裂或不分裂。蒴果长卵球形,与宿存花萼等长或较短,室背二瓣裂。种子小,椭圆球形。

7种,分布于广西和广东西部。

* 植物研究,1卷3期。