

毛;苞片对生,披针形,长约4.5毫米,宽1.5毫米,被疏柔毛;小苞片与苞片相似,较小;花梗长4—10毫米,被白色柔毛。花萼长约5毫米,5裂达基部,裂片狭三角形,宽1.1毫米,顶端尖,外面被疏柔毛。花冠白色,长约10.5毫米,外面被短疏柔毛,内面在下唇之下有短疏柔毛;筒粗筒状,长约7毫米,口部直径3.5毫米;上唇长约1.2毫米,2浅裂,下唇长3.5毫米,3裂至中部,裂片圆卵形。雄蕊无毛,花丝着生于距花冠基部2毫米处,披针状线形,长4毫米,花药长约2毫米;退化雄蕊3,无毛,侧生退化雄蕊着生于距花冠基部1毫米处,长约0.8毫米,中央退化雄蕊着生于距花冠基部0.5毫米处,长0.6毫米。花盘环状,高0.3毫米。雌蕊长约8毫米,子房卵球形,长2.5毫米,直径1.2毫米,有稍密的短柔毛,花柱长5毫米,疏被短柔毛,柱头长0.5毫米,2浅裂。花期6月。

特产广西临桂。

全草民间供药用。

34. 石山苣苔属*——*Petrocodon* Hance

Hance in Journ. Bot. **21**: 167. 1883.

多年生草本,具根状茎。叶均基生,具柄,长圆形,具羽状脉。聚伞花序有2苞片;花小。花萼钟状,5裂达基部,裂片线形。花冠白色,坛状粗筒形;筒比檐部稍长;檐部不明显二唇形,上唇比下唇稍短,2深裂,下唇3深裂。下(前)方2雄蕊能育,内藏,着生于花冠筒中部之下,花丝狭线形或线形,直,花药连着,2室近极叉开,顶端汇合;退化雄蕊2—3,小,着生于花冠上(后)方。花盘环形。雌蕊常伸出,子房线形,有2侧膜胎座及多数胚珠,柱头小,近球形。蒴果线形,室背开裂成2瓣。种子纺锤形,长约0.6毫米,种皮近平滑。

1种,特产我国南部至中部。

1. 石山苣苔(中国高等植物图鉴)

Petrocodon dealbatus Hance in Journ. Bot. **21**: 167. 1883; Clarke in A. DC. Monogr. Phan. **5**: 288. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 229. 1980; 中国高等植物图鉴 **4**: 141,图5696. 1975. — *P. longistylus* Kraenzl in Repert. Sp. Nov. **24**: 216. 1928.

1a. 石山苣苔(原变种) 图版114

P. dealbatus Hance var. *dealbatus*

多年生草本。根状茎直,长2.5—6厘米,粗2—10毫米。叶5—15,长2.2—28厘米,具柄;叶片纸质或薄革质,椭圆状倒卵形、椭圆形或长圆形,长1.5—16厘米,宽0.8—6.8厘米,顶端微尖或渐尖,基部宽楔形或楔形,边缘在中部之上有小浅齿,或呈波状近全缘,或有时有小牙齿,上面疏被短伏毛,下面沿脉密被短伏毛,侧脉每侧4—5条;叶柄长0.5—11

* 植物分类学报, 2卷4期。