

米。模式标本采自广东北部。

24. 绒毛长蒴苣苔

Didymocarpus demissus Hance in Journ. Bot. **21**:166. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 229. 1890.

多年生草本,具块状根状茎。叶约8枚,基生;叶片纸质,长椭圆形,长3.2—7厘米,宽1—2厘米,顶端微尖,基部渐狭,边缘近全缘,上面密被短柔毛并散生少数长柔毛,下面被灰白色短绒毛,侧脉每侧约3条,不明显;叶柄长2—3厘米。花序一回分枝,有1—3花;花序梗长达10厘米,密被短柔毛;苞片对生,线形,长4—10毫米,密被短柔毛;花梗长约1厘米。花萼长约4毫米,5裂达基部,裂片披针状线形,外面密被柔毛。花冠白色,长约2.2厘米,外面密被短柔毛;筒长约1.3厘米,口部直径约4毫米;上唇长约4毫米,下唇长约9毫米,裂片长圆形或长圆状倒卵形,顶端圆形。雄蕊2。雌蕊子房线形,与花柱均密被短柔毛。蒴果线形,直,长约5厘米,密被褐色短柔毛。花期10月。

产广东北部和西部(云浮)。生于低山阴处石上。模式标本采自广东北部连江流域。

我们只见到有叶的标本,上面花的描述系译自原始拉丁描述,并参考了模式标本照片。

25. 绵毛长蒴苣苔(植物研究)

Didymocarpus niveolanosus D. Fang et W. T. Wang in Bull. Bot. Res. **2**(2): 133. 1982.

多年生草本,具短根状茎。叶均基生,近无柄或具柄;叶片纸质,狭卵形,长3.4—4.6厘米,宽1.7—2厘米,顶端微钝,基部宽楔形或近圆形,边缘有不明显波状浅锯齿,两面被白色绵毛,侧脉每侧约5条;叶柄长达1厘米,粗约2毫米,被白绵毛。花序约5条,2—3回分枝;花序梗长4.5—6厘米,被绵毛;苞片对生,狭三角形或线形,长3—3.5毫米,宽0.6—1毫米,密被长柔毛;花梗长3—13毫米,被白色长柔毛和褐色短柔毛。花萼长2—2.5毫米,5裂至基部,裂片线状披针形,宽0.5—0.7毫米,被长柔毛。花冠粉红色,长约1.8厘米,外面疏被短柔毛,内面无毛;筒近筒状,长约1.1厘米,口部粗约3毫米;上唇长约4毫米,2裂至中部,下唇长约7毫米,3深裂,裂片披针形。雄蕊无毛,花丝着生于距花冠基部7.5毫米处,长约7毫米,宽约0.3毫米,花药长约1.5毫米;退化雄蕊3,近丝形,无毛,侧面2枚着生于距花冠基部6毫米处,长6毫米,顶端头状,中央1枚,着生于距花冠基部3.5毫米处,长1毫米。花盘环状,高约0.5毫米。雌蕊长约9毫米,子房长约5.5毫米,宽1毫米,与花柱被疏柔毛,柱头头状。花期7月。

产广西隆林。生于山谷阴处石上。

26. 闽赣长蒴苣苔(中国高等植物图鉴) 图版123

Didymocarpus heucherifolius Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 861. 1936;中国高等植物图鉴 **4**: 138, 图5689. 1975. ——*Chirita heucherifolia* (Hand. -Mazz.) Wood in