

处,长2—3毫米,顶端近头状。花盘杯状,高约2毫米。雌蕊长1.3—1.7厘米,子房密被短腺毛,宽1.5毫米,花柱长约1毫米,无毛,柱头点状。

产浙江丽水。

36. 圆唇苣苔属——*Gyrocheilos* W. T. Wang

W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(3): 28. 1981.

多年生草本植物,具粗壮根状茎。叶均基生,具长柄,肾形或心形,边缘有重牙齿,有掌状脉。花序聚伞状,腋生,3—4回分枝,有多数花和2苞片;花小。花萼宽钟状,5裂至基部或5至2深裂,裂片线形或长圆形。花冠紫色或淡红色,筒粗筒状,与檐部近等长,檐部二唇形,上唇半圆形,不分裂,下唇3深裂。下(前)方2雄蕊能育,花丝披针状线形,不膝状弯曲,花药宽椭圆球形,连着,2药室极叉开,顶端汇合;退化雄蕊2,位于上(后)方,小,狭线形或棒状。花盘环状。雌蕊自花冠口伸出甚高,子房线形,顶端渐变狭成与其近等长的花柱,2侧膜胎座稍内伸即极叉开,具胚珠,柱头小,头状。蒴果构造与长蒴苣苔属的相似。种子小,扁,纺锤形。

4种,分布于广西和广东西部。

分种检索表

1. 花萼外面自基部至顶端被柔毛;叶多宽卵形,上面被短和长的两种毛.....
..... 2. 毛萼圆唇苣苔 *G. lasiocalyx* W. T. Wang
1. 花萼外面无毛或顶端有疏柔毛。
 2. 叶多为肾形,顶端圆形,上面被短和长的两种毛;退化雄蕊着生于距花冠基部2.5毫米处;花序梗被开展的柔毛。
 3. 花萼5裂达基部..... 1. 圆唇苣苔 *G. chorisepalum* W. T. Wang var. *chorisepalum*
 3. 花萼4裂至距基部1—1.5毫米处.....
..... 1b. 北流圆唇苣苔 *G. chorisepalum* var. *synsepalum* W. T. Wang
 2. 叶心形或心状卵形,顶端急尖,上面被近等长的一种毛;退化雄蕊着生于距花冠基部3—5毫米处。
 4. 叶上面被长0.1—0.2毫米的短毛,下面沿脉被短伏毛,其它部分近无毛;叶柄及花序梗的毛长0.2—0.6毫米,向前贴伏;花萼5裂达或近基部.....
..... 3. 微毛圆唇苣苔 *G. microtrichum* W. T. Wang
 4. 叶两面均稍密被长0.6—1.6毫米的毛;叶柄和花序梗的毛长0.8—2毫米,平展和向后方开展;花萼深裂至距基部1.5—2毫米处。
 5. 花萼5深裂;退化雄蕊棒状.....
..... 4. 折毛圆唇苣苔 *G. retrotrichum* W. T. Wang var. *retrotrichum*
 5. 花萼4—2深裂;退化雄蕊狭线形.....
..... 4b. 稀裂圆唇苣苔 *G. retrotrichum* var. *oligolobum* W. T. Wang