

1. 圆唇苣苔(植物研究)

Gyrocheilos chorisepalum W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(3): 31, pl. 2, fig. 1—5, pl. 4, fig. 2. 1981. — *Didymocarpus floribundus* Chun ex W. T. Wang, l. c., pro syn., non (Henderson) Burtt, 1971.

1a. 圆唇苣苔(原变种) 图版 125: 1—4

G. chorisepalum var. **chorisepalum**

多年生草本。根状茎长 2.5—4.5 厘米,粗 5—7 毫米。叶约 5,具长柄;叶片革质或纸质,近圆形或肾形,长 3—6 厘米,宽 3—8 厘米,顶端圆形,基部心形,边缘有重牙齿,上面被 0.2—0.3 毫米和长 0.8—2.5 毫米两种白色柔毛,下面被疏柔毛,掌状脉 5—7 条;叶柄长 3—8 厘米,有开展的柔毛。聚伞花序 2—3 条,长 3—9 厘米,2—3 回分枝,每花序有 5 至多数花;花序梗长 10—23 厘米,被柔毛;苞片对生,卵形,长 4—6 毫米,宽 3—4 毫米,被短柔毛;小苞片长圆形或卵形,长 2.8—4 毫米,近顶部被疏柔毛;花梗长 6—15 毫米,无毛。花萼长 3—4 毫米,5 裂达基部,裂片狭长圆形、披针状线形或倒卵状长圆形,宽 1—1.5 毫米,微钝,外面近顶端处被疏柔毛,内面无毛。花冠淡红色,长约 12 毫米,无毛;筒长 6 毫米,口部直径 3.5—4 毫米;上唇长 2.8 毫米,下唇长 6 毫米,3 裂至中部,裂片圆卵形。雄蕊无毛,花丝着生于距花冠基部 2 毫米处,线形,长 3 毫米,花药长 2.5 毫米;退化雄蕊 2,着生于距花冠基部 2.5 毫米处,狭线形,长 0.8—0.9 毫米,顶端头状。花盘环状,高约 0.3 毫米。雌蕊长约 11 毫米,无毛,子房长 5 毫米,直径 0.8 毫米,柱头头状。蒴果线形,长 2—3 厘米,宽 1.2—2 毫米,无毛。种子褐色,纺锤形,长约 0.5 毫米。花期 4—5 月。

特产广西上林及武鸣一带山地。生于山谷溪边石上或陡崖阴湿处。模式标本采自武鸣大明山。“

1b. 北流圆唇苣苔(变种)(植物研究)

G. chorisepalum var. **synsepalum** W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 2(2): 135. 1982. — *Didymocarpus* sp. nov. Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 231. 1890. — *D. hemsleyanus* Lévl. in Compt. Rend. Assoc. France 34: 426. 1906, nom. nud.; Lauener et Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. 38(3): 468. 1980.

与圆唇苣苔的区别: 花萼 4 深裂至距基部 1—1.5 毫米处,较大的裂片顶端 2 浅裂。产广西东部(北流)和广东西部。生于山地石上。模式标本采自广西北流。

2. 毛萼圆唇苣苔(植物研究)

Gyrocheilos lasiocalyx W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 2(2): 135. 1982.

多年生草本。根状茎长达 5.5 厘米,粗约 5 毫米。叶约 4,均基生;叶片草质,卵形或宽卵形,有时近圆形,长 3—6.7 厘米,宽 2.5—7.5 厘米,顶端急尖,稀近圆形,基部心形,边缘具重牙齿,上面被长 1.2—3 毫米及长 0.2—0.4 毫米的两种伏毛,下面沿脉被短柔毛,侧脉每侧约 5 条;叶柄长 1.5—8.5 厘米,与花序梗被开展的长柔毛(毛长 1—3.2 毫米)。花