

10.5—14 厘米,宽 14 厘米,顶端微尖,基部心形,边缘有重牙齿,两面被长 0.6—1.6 毫米的短伏毛,掌状脉 7 条;叶柄长达 15 厘米,密被开展或向下斜展的毛(毛长 0.8—2 毫米)。聚伞花序约 3 条,长 7—11 厘米,4 回分枝,具多数花;花序梗长 24—34 厘米,被开展的柔毛;苞片对生,卵形,长 6—8 毫米,边缘有浅钝齿,被短柔毛;小苞片卵形或披针形,长 2.5—5 毫米,被疏柔毛或无毛;花梗长 5—10 毫米,无毛。花萼钟状,长约 4 毫米,无毛或在一些裂片顶端有 1—3 条小毛,5 裂至距基部 1.5—2 毫米处;裂片线状披针形,宽 1.2 毫米,微钝。花冠紫色,长约 13 毫米,无毛;筒长 7.5 毫米,口部粗 4 毫米;上唇长 3 毫米,下唇长 5.5 毫米,3 裂至中部之下,裂片长圆形。雄蕊无毛,花丝着生于距花冠基部 4 毫米处,披针状线形,长 3 毫米,花药长 2.5 毫米;退化雄蕊 2,着生于距花冠基部 5 毫米处,棒状,长约 1.5 毫米,无毛。花盘高 0.5 毫米。雌蕊长约 14 毫米,无毛,子房长 6 毫米,直径 0.6 毫米。花期 3 月。

特产广东信宜和云浮。生于山谷林中。模式标本采自信宜。

4b. 稀裂圆唇苣苔(变种)(植物研究)图版 125: 5

G. retrotrichum W. T. Wang var. **oligolobum** W.T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(3): 35, pl. 2, fig. 11. 1981.

与折毛圆唇苣苔的区别: 花萼 4—2 裂;退化雄蕊狭线形,长 0.5 毫米,顶端头状。

产广西(罗城、融水)、广东(茂名)、贵州(从江)。生于山谷林中或阴处石上,海拔 480—1500 米。模式标本采自广西融水。

37. 长檐苣苔属*——**Dolicholoma** D. Fang et W.T. Wang

D. Fang et W. T. Wang in Bot. Res. no. 1:18. 1983.

多年生无茎小草本,具圆柱状根状茎。叶均基生,具柄,椭圆形,边缘的小齿退化成腺体,叶脉羽状。聚伞花序腋生,有少数花,有 1—2 苞片;花小。花萼钟状,5 裂达基部,裂片狭线形。花冠淡红色,筒细筒状,檐部大,比筒稍长,二唇形,上唇 2 裂几达基部,下唇 3 深裂,所有裂片狭三角形。下(前)方 2 雄蕊能育,内藏,花丝着生于花冠筒口部之下,狭线形,直,花药近背着,连着,2 室极叉开,顶端汇合;退化雄蕊 2,位于花冠上(后)方,小,狭线形。花盘环状。雌蕊内藏,子房狭卵球形,比花柱稍短,花柱细,柱头盘状。蒴果长椭圆形,稍比花萼长,纵裂成 4 瓣。种子小,长椭圆形,两端尖,光滑。

1 种,特产我国广西西南部。

1. 长檐苣苔(植物学集刊)图版 126

Dolicholoma jasminiflorum D. Fang et W. T. Wang in Bot. Res. no. 1:19,

* 植物学集刊,第一集。