

卵形或长圆形,两侧稍不相等,长4.5—9.5厘米,宽2—4.2厘米,顶端微尖,基部钝、圆形或宽楔形,边缘有小齿,两面稍密被短柔毛,或下面被疏柔毛,侧脉每侧5—8条;叶柄长3—14.5厘米,与花序梗密被贴伏柔毛。花序有9—11花;花序梗长9—20厘米;苞片约6,密集,狭卵形或披针形,长1—1.7厘米,宽2—10毫米,被短伏毛;花梗长2—4毫米,被淡黄色柔毛。花萼长3—7毫米,裂片狭线状披针形,宽0.3—0.75毫米,外面被短柔毛。花冠朱红色,长1.9—2.5厘米,外面密被,内面疏被短毛;筒长1.5—2.1厘米,口部粗约5毫米,基部粗3毫米;上唇长4毫米,下唇狭三角形,长2—3毫米。雄蕊花丝着生于距花冠基部9毫米处,长4—6毫米,有少数腺体,花药长约1.8毫米,无毛;退化雄蕊2,着生于距花冠基部7毫米处,长约0.5毫米。花盘高0.7—1毫米,边缘波状。雌蕊长约2.3厘米,子房长1.1—1.5厘米,宽约0.8毫米,无毛,花柱有少数小腺毛。蒴果线形,长约6厘米。

花期4—6月。

产云南东南部(麻栗坡、西畴、富宁)和广西西部(那坡、乐业)。生于石灰岩山林中石上,海拔1000—1460米。模式标本采自云南西畴。

39. 异唇苣苔属*——*Allocheilos* W.T. Wang

W. T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.* **21**(3):321. 1983。

多年生小草本,无茎;根状茎圆柱形,细。叶均基生,具柄,近圆形,具羽状脉。聚伞花序腋生,有2苞片和少数花;花小。花萼钟状,5裂达基部,裂片披针状线形。花冠斜钟状;筒比檐部短;檐部二唇形,上唇4裂,裂片三角形,下唇与上唇近等长,不分裂,三角形。下(前)方2雄蕊能育,着生于花冠基部稍上处;花丝狭线形,弧状弯曲;花药狭椭圆球形,连着,2室极叉开,顶端汇合。退化雄蕊2,位于上(后)侧方,小。花盘环状。雌蕊长伸出;子房近长圆形,1室,2侧膜胎座内伸,2裂,裂片向后弯曲,有多数胚珠,花柱比子房长2.5倍,柱头小,扁球形。蒴果近线形,最后裂成4瓣。

1种,特产贵州西南部。

1. 异唇苣苔(植物分类学报) 图版71: 7—13(见274页)

Allocheilos coriusiflorum W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.* **21**(3):323, fig. 1:7—13. 1983; et in *Guihaia* **6**(1—2):6. 1986。

多年生小草本。根状茎圆柱形,细,粗约3毫米。叶约6,均基生,长1.4—5.5厘米,具短或长柄;叶片干时革质,圆卵形或近圆形,长0.9—2.2厘米,宽1—2.4厘米,顶端圆形,基部浅心形,边缘有小圆齿或浅钝齿,上面被贴伏疏柔毛,下面密被淡褐色柔毛,侧脉每侧约4条,不明显;叶柄长0.3—4厘米,扁,宽约1毫米,被开展长柔毛。聚伞花序

* 植物分类学报, 21卷3期。