

圆形,长约 0.6 毫米。花期 7—8 月,果期 9 月。

产浙江、福建、江西、广东、广西、湖南、湖北、河南、山东、河北、辽宁、山西、陕西、四川及云南。生于山坡路旁岩石上,海拔 200—1320 米。模式标本采自北京附近。

全草药用,味甘,性温,治中耳炎、跌打损伤等。

3. 大花旋蒴苣苔 图版 131:5—7

Boea clarkeana Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:232. 1890; 中国高等植物图鉴 **4**:146, 图 5705, 1975. — *B. mairei* Lévl. in Repert. Sp. Nov. **12**:286. 1913; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 883. 1936. — *Sireptocarpus clarkeanus* (Hemsl.) Hilliard et Burtt, African Plant Study **373**. 1971; Lauener et Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. **38**(3):472. 1980.

多年生无茎草本。叶全部基生,具柄;叶片宽卵形,长 3.5—7 厘米,宽 2.2—4.5 厘米,顶端圆形,基部宽楔形或偏斜,边缘具细圆齿,两面被灰白色短柔毛,侧脉每边 5—6 条,上面不明显,下面稍隆起;叶柄长 1.5—6 厘米,被灰白色短柔毛。聚伞花序伞状,1—3 条,每花序具 1—5 花;花序梗长 7—13 厘米,被灰白色短柔毛;苞片 2,卵形或卵状披针形,长 5—7 毫米,外面被短柔毛;花梗长 5—10 毫米,被灰白色短柔毛。花萼钟状,长 6—8 毫米,5 裂至中部,裂片相等,长圆形或卵状长圆形,长 3.5—4 毫米,宽 1.2—3 毫米,顶端钝或短渐尖,全缘,外面被灰白色短柔毛。花较大,长 2—2.2 厘米,直径 1.2—1.8 厘米,淡紫色,筒长约 1.5 厘米,直径约 7 毫米;檐部稍二唇形,上唇 2 裂,比下唇短,裂片相等,卵圆形,长约 5 毫米,宽约 6 毫米,下唇 3 裂,裂片相等,与上唇同形,长约 4 毫米,宽约 6 毫米。雄蕊 2,花丝长 7 毫米,扁平,无毛,着生于距花冠基部 3 毫米处,花药大,长圆形,长约 3.2 毫米,药室 2,汇合;退化雄蕊 2,长约 2.2 毫米,着生于距花冠基部 5 毫米处。无花盘。子房长圆形,长约 8 毫米,直径约 1.2 毫米,外面被淡褐色短柔毛,花柱细,与子房近等长,无毛,柱头 1,头状,膨大。蒴果长圆形,长 3.5—4.5 厘米,直径约 3 毫米,外面被短柔毛,螺旋状卷曲,干时变黑色。种子卵圆形,长 0.6—0.8 毫米。花期 8 月,果期 9—10 月。


产浙江、安徽、江西、湖南、湖北、陕西、四川及云南西北部。生于山坡岩石缝中,海拔 500—700 米。模式标本采自湖北宜昌附近。

全草药用,治外伤出血、跌打损伤等症。

42. 喜鹊苣苔属*——*Ornithoboea* Parish ex Clarke

Parish ex Clarke in A. DC. Monogr. Phan. **5**:147. 1883; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 365. 1884; Burtt in Not. Bot. Gard.

* 植物分类学报, 2 卷 4 期。



1—4.地胆旋蒴苣苔 *Boea philippensis* Clarke; 1.植株全形, 2.花冠打开, 3.雄蕊放大, 4.花萼及雌蕊。5—7.大花旋蒴苣苔 *B. clarkeana* Hemsl.; 5.叶片下面, 6.花冠打开, 7.花萼及雌蕊。8—10.旋蒴苣苔 *B. hygrometrica* (Bunge) R. Br.; 8.叶片上面, 9.花冠打开, 10.花萼及雌蕊。(刘春荣绘)