

痕,花萼小,长约6毫米,花冠裂片三角形,顶端锐尖,可与后者区别。

43. 唇萼芭苔属*——*Trisepalum* Clarke

Clarke in A. DC. Monogr. Phan. **5**: 138. 1883; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 363. 1884; Fritsch in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **4** (3b): 150. 1894; Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. **41** (3): 441. 1984. — *Dichiloboea* Stapf in Kew Bull. **1913**: 356. 1913; Ridley, Fl. Malay Penins. **2**: 537. 1923; Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. **21**: 196. 1954.

多年生草本,稀一年生草本。有茎或无茎,茎下部常木质化,有时具分枝,幼时密被绵毛。叶对生或莲座状,密被有分枝的蛛丝状绵毛。聚伞花序呈二歧式、单歧式或组成圆锥花序,腋生;花梗成对,常不等长;苞片不明显,或具较大的苞片。花萼二唇形,上唇上部3裂,下唇2裂至基部。花冠狭钟状,白色、淡紫色、粉红色;檐部稍二唇形,上唇3裂,下唇2裂。雄蕊2,位于花冠下(前)方近基部,花丝较短,内藏,花药椭圆形,药室2,顶端连着,叉开;退化雄蕊1,位于花冠上(后)方中央近基部。花盘环状。子房椭圆形,花柱与子房等长,柱头2,舌状。蒴果螺旋状卷曲。

约13种,分布于我国西南部,以及缅甸、泰国及马来亚。我国有1种,产云南、四川。

1. 唇萼芭苔(中国高等植物图鉴) 图版133: 1—3

Trisepalum birmanicum (Craib) Burtt in Not. Bot. Gard. Edinb. **41** (3):446. 1984. — *Boea birmanica* Craib in Kew Bull. **1913**: 114. 1913. — *Dichiloboea birmanica* (Craib) Stapf in Kew Bull. **1913**: 357. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 883. 1936; 中国高等植物图鉴 **4**: 144, 图5702. 1975.

多年生草本。根状茎长3—8厘米,直径4—7毫米;茎高15—30厘米,密被灰白色蛛丝状绵毛。叶对生,具柄;叶片长圆形,椭圆形,长2.5—5厘米,宽1.2—3厘米,顶端钝或微尖,基部浅心形或楔形,边缘具细锯齿,上面密被柔毛,偶见灰白色绵毛,下面密被淡褐色或灰白色绵毛,侧脉每边5—7条,上面不明显,下面隆起,近叶缘小脉彼此连结;叶柄长0.6—1厘米,密被绵毛。聚伞花序,组成总状圆锥花序,顶生和腋生;花序梗长3—6厘米,与花梗被蛛丝状绵毛;苞片2,倒卵形,或倒卵状匙形,长7—9毫米,宽2—3毫米,全缘,被绵毛;花梗长短不等,长6—12毫米。花萼长约7毫米,外面被绵毛,内面无毛,上唇宽,约3毫米,顶端具3齿,齿长0.7—1毫米,下唇2裂至近基部,裂片相等,线形,长约6毫米,宽约1.2毫米。花冠粉红色,稀白色,长约7毫米,直径约5毫米,外面无毛;筒长4毫米,直径约3.5毫米;上唇3裂,下唇2裂,裂片近相等,全部裂片卵圆形,长2—2.5毫米,

* 植物分类学报, 2卷4期。