

形或长圆形,长 5.5—9 厘米,宽 1.6—3.5 厘米,顶端尾状或渐尖,基部宽楔形,全缘,侧脉每侧 4—5 条,稍明显;叶柄长 0.7—1.5 厘米。聚伞花序生茎顶或茎上部叶腋,有 3—4 花,具短花序梗,或单花腋生,无花序梗及苞片;花序梗粗壮,长 2.5—5(—10)毫米,无毛;苞片对生,披针形或狭卵形,长 6—13 毫米,宽 2—5 毫米,顶端钝,无毛;花梗长 4—10 毫米,无毛。花萼长 7—9 毫米,无毛,5 裂至基部,裂片披针状线形,宽 1.1—1.5 毫米。花冠红色,在下唇有深红色斑,长约 3.5 厘米,外面无毛,内面只在下唇有稀疏极短的腺毛;筒长约 2.9 厘米,上部粗 7 毫米,下部粗 3.5 毫米;上唇长 4.5 毫米,2 浅裂,下唇近等长,3 深裂,裂片卵形。雄蕊伸出,花丝着生于花冠筒中部之上,长 1.4—2 厘米,有疏柔毛;花药长约 1.5 毫米,无毛;退化雄蕊长约 0.6 毫米。花盘粗筒状,高约 1.5 毫米。雌蕊长约 3.5 厘米,疏被短腺毛。蒴果长约 9 厘米,有稀疏短腺毛。种子纺锤形,长约 0.8 毫米,每端各有 1 条长约 1.5 毫米的毛。花期 9—10 月。

产云南西北部(福贡至贡山一带)。生于山地林中树上,海拔 1 150—2 000 米。在缅甸北部也有分布。

5. 显苞芒毛茛苔(植物分类学报)

Aeschynanthus bracteatus Wall. ex A. DC. Prodr. 9:261. 1845; Clarke in A. DC. Monogr. Phan. 5: 31. 1883; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 342. 1884; Marq. in Journ. Linn. Soc. Bot. 48: 214. 1929; Burtt et Davidson in Not. Bot. Gard. Edinb. 21: 229—230. 1955, p. p.; Hara, Fl. East. Himal. 2nd rep.: 121. 1971; H. W. Li in Acta Bot. Yunnan. 5(1): 29. 1983, p. p. — *A. peelii* Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Ill. Himal. Pl. 17. 1855; Anthony in Not. Bot. Gard. Edinb. 18: 191. 1934; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 885. 1936.

5a. 显苞芒毛茛苔(原变种) 图版 138: 1—3

A. bracteatus var. **bracteatus**

附生小灌木。茎长 60—120 厘米,分枝,无毛。叶对生,无毛;叶片革质,狭卵形、椭圆状卵形或宽披针形,长 4.4—11 厘米,宽 1.5—4.5 厘米,顶端渐尖,基部圆形,边缘全缘,上面干时多皱褶,侧脉每侧 5—6 条,弧状弯曲,中部以上向上方展出;叶柄长 5—15 毫米。花序生分枝上部叶腋,有 3—7 朵花,无毛;花序梗长 0.8—5.2 厘米,稀不存在;苞片对生,红色,膜质,宽披针形或卵形,长 2—3 厘米,宽 6—14 毫米;花梗长 8—12 毫米。花萼红色,膜质,长 1.2—1.9 厘米,无毛,5 裂至基部,裂片披针状线形,宽(1.2—)2—3.2 毫米,顶端钝或微尖。花冠红色,长 3.2—4.2 厘米,外面及内面均无毛,在边缘有稀疏短柔毛;筒长 2.6—3.3 厘米,上部粗 7—10 毫米,下部粗 2—3 毫米;上唇长 6—8 毫米,2 浅裂,下唇与上唇近等长,3 裂,裂片狭卵形。雄蕊伸出,花丝着生于花冠筒中部附近,长约 2.5 厘米,有稀疏短腺毛,花药长 1.8—2.5 毫米,无毛;退化雄蕊长约 0.5 毫米。花盘高约 1.2 毫米。雌蕊线形,长约 2.8 厘米,子房有稍密的短腺毛。蒴果线形,长 8—10 毫米,有稀疏短腺毛。