

产湖南西北部(桑植)和湖北西南部(咸丰)。生于山地岩石上。模式标本采自湖北咸丰。

18. 峨眉吊石苣苔(广西植物) 图版 146: 1—2 (见 534 页)

Lysionotus omeiensis W. T. Wang in *Guihaia* 3(4): 271, pl. 1, fig. 1—2. 1983.

附生小亚灌木。茎肉质,长约 25 厘米,粗 1—2 毫米,分枝,被贴伏短柔毛。叶小,对生或近对生,少数互生;叶片肉质,干时革质,椭圆形、倒卵形或狭倒卵形,长 4—11 毫米,宽 3—6 毫米,顶端钝形或微钝,基部宽楔形或圆形,边缘中部之上有 1—2 浅钝齿或近全缘,上面近边缘处被短柔毛,下面无毛,叶脉不明显;叶柄长 0.8—1.5 毫米,被疏柔毛。聚伞花序生最上部叶腋,有 1 花,无毛;花序梗长约 1.8 厘米;苞片小,钻形,长约 0.8 毫米;花梗长约 1 厘米。花萼长约 4 毫米,无毛,5 裂达基部,裂片三角状线形,长 3—4 毫米,宽约 0.8 毫米。花盘环状,高 1 毫米。雌蕊长约 4 厘米,无毛,雌蕊柄长约 6 毫米,子房近线形,长约 2 厘米,宽 2 毫米,花柱长约 1.2 厘米。果期始于 9 月。

产四川峨眉山。生山谷树上,海拔约 1500 米。

系 2. 吊石苣苔系——*Ser. Lysionotus*——*Ser. Serrati* W. T. Wang in *Guihaia* 3(4): 272. 1983.

花萼 5 裂达或近基部。药隔背面具附属物。

19. 广西吊石苣苔(植物分类学报)

Lysionotus kwangsiensis W. T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.* 13(2):68. 1975; et in *Guihaia* 3(4): 272. 1983.

小灌木。茎长约 30 厘米,近圆柱形,直径约 3 毫米,光滑,无毛,疏生椭圆形皮孔。叶对生,无毛;叶片革质,长圆形、狭椭圆形或狭长圆形,长 5—10 厘米,宽 1.5—4.5 厘米,顶端多短渐尖,稀钝,基部稍斜,圆形或宽楔形,边缘在基部之上有较多不明显小牙齿,侧脉每侧 5—7 条,不明显;叶柄长 0.9—1.5 厘米。花序腋生,有 1—2 花,无毛;花序梗长 1.5—4 厘米,有 4 条纵稜,沿稜有极狭的翅;苞片对生,狭椭圆形或线形,长 4—5 毫米,宽 1.2—3 毫米,边缘有钝齿或全缘;花梗长 1.2—2 厘米。花各部均无毛。花萼长 9—12 毫米,5 裂达基部,裂片披针状线形,稍不等大,宽 1—2 毫米。花冠淡紫色,长约 4 厘米;筒细漏斗形,长约 3 厘米,口部直径约 1.2 厘米;上唇长约 5 毫米,2 浅裂,下唇长 10—13 毫米,3 浅裂,裂片宽卵形。雄蕊的花丝与退化雄蕊均着生于距花冠基部 12 毫米处,线形,长约 15 毫米,中部卷曲,花药近圆形,直径约 2 毫米,药隔背面突起卵状线形,长约 1.5 毫米;退化雄蕊 2,狭线形,长 8—10 毫米。花盘环状,高 1.2 毫米,边缘波状。雌蕊长约 2.3 厘米,宽 2 毫米。蒴果线形,长 5—6 厘米,宽 2.5 毫米,无毛。种子纺锤形,长约 0.8 毫米,毛长 0.9—1.2 毫米。花期 7 月。



1—2.峨眉吊石苣苔 *Lysionotus omeiensis* W. T. Wang: 1.果枝, 2.果萼。3—4.小叶吊石苣苔 *L. microphyllus* W. T. Wang: 3.果枝, 4.果萼。5.圆苞吊石苣苔 *L. involueratus* Franch: 果枝。6—11.长梗吊石苣苔 *L. longipedunculatus* (W. T. Wang) W. T. Wang: 6.开花植株, 7.花冠打开, 8.花药, 9.花萼及雌蕊, 10.蒴果, 11.种子。(刘春荣绘)