

及日本也有分布。

全草可供药用,治跌打损伤等症。

22b. 灰叶吊石苣苔(变种)(广西植物)

L. pauciflorus var. **indutus** Chun ex W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 275. 1983.

与吊石苣苔的区别: 枝条被开展的淡褐色短柔毛;叶两面被白色短柔毛。

产贵州威宁。生于开阔山地。

22c. 宽叶吊石苣苔(变种)(广西植物)

L. pauciflorus var. **latifolius** W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 275. 1983.

与吊石苣苔的区别: 叶较大,椭圆形或长圆形,长(2.5—)5—7.2 厘米,宽 1.8—3.8 厘米。

分布于云南东南部(麻栗坡、西畴)、广西西部和南部(钦州)及贵州南部(兴仁、册亨、罗甸、贵阳)。生于山地林中或灌丛中,生树上或石上,或潮湿陡崖上,海拔 400—1400 米。模式标本采自广西那坡。

全株供药用,治骨折等症。

22d. 条叶吊石苣苔(变种)(广西植物)

L. pauciflorus var. **linearis** Rehd. in *Journ. Arn. Arb.* **18**: 246. 1937; Lauener et Burtt in *Not. Bot. Gard. Edinb.* **38**(3): 469. 1980; W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 276. 1983. — *L. cavaleriei* Lévl. in *Repert. Sp. Nov.* **9**: 328. 1911, non Lévl. 1909.

与吊石苣苔的区别: 叶线形或狭线形,长 3.3—5.5 厘米,宽 4—8 毫米;花盘环状。

分布于广西北部(融水、龙胜)和贵州南部(贵定平伐)。生于山谷林中石上,海拔 920—1100 米。模式标本采自贵州平伐。

22e. 披针吊石苣苔(变种)(广西植物)

L. pauciflorus var. **lanceifolius** W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 276. 1983.

与吊石苣苔的区别: 叶较大,披针状长圆形或披针形,长 5—8.5 厘米,宽 1—2 厘米。

产广西东兴。生于低山石上,海拔 360—500 米。

22f. 毛花吊石苣苔(变种)(广西植物)

L. pauciflorus var. **lasianthus** W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 276. 1983.

与吊石苣苔的区别: 花冠外面被短柔毛;花盘环状,边缘波状。

产广西猫儿山。生于山谷林中树上,海拔约 1400 米。

23. 兰屿吊石苣苔(广西植物)

Lysionotus ikedae Hatusima in *Mem. Fac. Agr. Kagoshima Univ.* **7**(2): 324. 1970; 台湾植物志 **4**: 677, pl. 1154. 1978.

附生小灌木,有长根状茎。茎直立,高 15—30 厘米,无毛,有少数分枝。叶对生或 3

枚轮生,倒卵状椭圆形、宽椭圆形或长圆形,长2—9厘米,宽2—4厘米,顶端钝或微尖,基部宽楔形,边缘有小牙齿或浅齿,无毛,中脉明显,侧脉不明显;叶柄长5—15毫米。花序生茎顶部叶腋,有1—3花;花序梗长2—4厘米,无毛,苞片小,倒披针形,外面疏被短柔毛。花萼长5—8毫米,无毛,5裂至基部,裂片线状狭披针形。花冠白色带淡紫色,长3.5—4.5厘米,外面下部被短柔毛,其他部分无毛;筒细漏斗状;上唇2深裂,下唇3深裂,裂片卵形。雄蕊花丝着生于花冠筒中部之下,长15毫米,无毛,花药卵形,长2.2毫米,药隔突起有小腺体;退化雄蕊3,侧生的长约3毫米,中央的极小。花盘环状,边缘浅波状。雌蕊长1.2—2.8厘米,无毛。蒴果狭线形,长5—8厘米。种子纺锤形,小,每端各有一根细毛。

产我国台湾。

我们未见到本种标本,以上描述系根据《台湾植物志》写出。

24. 高山吊石苣苔 (广西植物)

Lysionotus montanus Kao et Devol in *Taiwania* **17**(2): 158. 1972; 台湾植物志 **4**: 677. 1978.

附生小灌木,具细长根状茎。茎直立,高达30厘米,粗约3毫米,有少数分枝。叶3—7枚轮生,具柄,革质,椭圆形,长3—7厘米,宽1.5—2厘米,顶端急尖,基部尖或钝,中脉明显,上面凹陷,下面隆起,侧脉不明显;叶柄长3—7毫米,在上面纵沟中有短伏毛。花序有1—3花;花序梗长约2厘米;苞片对生,卵形,长2毫米,外面疏被短毛。花萼5裂,裂片线状披针形,长4—7毫米,疏被短毛。花冠无毛,长约5厘米。雄蕊花丝着生于花冠筒下部变细部分的顶端,丝形,长约16毫米,花药连着;退化雄蕊2,连着,长约8毫米。子房圆筒形,长约3厘米,柱头头状。蒴果细长,长8厘米。种子线形,长约2毫米,每端各有1根细毛。

产我国台湾北部和东部。

我们未见到本种标本,以上描述系根据《台湾植物志》写出。

25. 齿叶吊石苣苔 (中国高等植物图鉴)

Lysionotus serratus D. Don in *Edinb. Phil. Journ.* **7**: 85. 1822; Hook. f. in *Curtis's Bot. Mag.* **107**: tab. 6538. 1881; Clarke in *A. DC. Monogr. Phan.* **5**: 58. 1883; et in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **4**: 344. 1884; Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **39**: 966. 1911; Burtt in *Not. Bot. Gard. Edinb.* **22**: 311. 1958; 中国高等植物图鉴 **4**: 117, 图 5684. 1975; Lauener et Burtt in *Not. Bot. Gard. Edinb.* **38**(3): 469. 1980; W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 277. 1983. — *L. ternifolia* Wall. *Pl. As. Rar.* **2**: 20, tab. 118. 1831; Clarke, *Comm. et Cyrt. Beng.* tab. 52. 1874. — *Didymocarpus esquirolii* Lév. in *Repert. Sp. Nov.* **9**: 328. 1911.

25a. 齿叶吊石苣苔 (原变种) 图版 150: 3—4