

枚轮生,倒卵状椭圆形、宽椭圆形或长圆形,长2—9厘米,宽2—4厘米,顶端钝或微尖,基部宽楔形,边缘有小牙齿或浅齿,无毛,中脉明显,侧脉不明显;叶柄长5—15毫米。花序生茎顶部叶腋,有1—3花;花序梗长2—4厘米,无毛,苞片小,倒披针形,外面疏被短柔毛。花萼长5—8毫米,无毛,5裂至基部,裂片线状狭披针形。花冠白色带淡紫色,长3.5—4.5厘米,外面下部被短柔毛,其他部分无毛;筒细漏斗状;上唇2深裂,下唇3深裂,裂片卵形。雄蕊花丝着生于花冠筒中部之下,长15毫米,无毛,花药卵形,长2.2毫米,药隔突起有小腺体;退化雄蕊3,侧生的长约3毫米,中央的极小。花盘环状,边缘浅波状。雌蕊长1.2—2.8厘米,无毛。蒴果狭线形,长5—8厘米。种子纺锤形,小,每端各有一根细毛。

产我国台湾。

我们未见到本种标本,以上描述系根据《台湾植物志》写出。

24. 高山吊石苣苔 (广西植物)

Lysionotus montanus Kao et Devol in *Taiwania* **17**(2): 158. 1972; 台湾植物志 **4**: 677. 1978.

附生小灌木,具细长根状茎。茎直立,高达30厘米,粗约3毫米,有少数分枝。叶3—7枚轮生,具柄,革质,椭圆形,长3—7厘米,宽1.5—2厘米,顶端急尖,基部尖或钝,中脉明显,上面凹陷,下面隆起,侧脉不明显;叶柄长3—7毫米,在上面纵沟中有短伏毛。花序有1—3花;花序梗长约2厘米;苞片对生,卵形,长2毫米,外面疏被短毛。花萼5裂,裂片线状披针形,长4—7毫米,疏被短毛。花冠无毛,长约5厘米。雄蕊花丝着生于花冠筒下部变细部分的顶端,丝形,长约16毫米,花药连着;退化雄蕊2,连着,长约8毫米。子房圆筒形,长约3厘米,柱头头状。蒴果细长,长8厘米。种子线形,长约2毫米,每端各有1根细毛。

产我国台湾北部和东部。

我们未见到本种标本,以上描述系根据《台湾植物志》写出。

25. 齿叶吊石苣苔 (中国高等植物图鉴)

Lysionotus serratus D. Don in *Edinb. Phil. Journ.* **7**: 85. 1822; Hook. f. in *Curtis's Bot. Mag.* **107**: tab. 6538. 1881; Clarke in *A. DC. Monogr. Phan.* **5**: 58. 1883; et in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **4**: 344. 1884; Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **39**: 966. 1911; Burtt in *Not. Bot. Gard. Edinb.* **22**: 311. 1958; 中国高等植物图鉴 **4**: 117, 图 5684. 1975; Lauener et Burtt in *Not. Bot. Gard. Edinb.* **38**(3): 469. 1980; W. T. Wang in *Guihaia* **3**(4): 277. 1983. — *L. ternifolia* Wall. *Pl. As. Rar.* **2**: 20, tab. 118. 1831; Clarke, *Comm. et Cyrt. Beng.* tab. 52. 1874. — *Didymocarpus esquirolii* Lév. in *Repert. Sp. Nov.* **9**: 328. 1911.

25a. 齿叶吊石苣苔 (原变种) 图版 150: 3—4