

长约 1.2 毫米。浆果白色,卵球形,长约 4 毫米。花期 6—8 月。

产西藏东南部(墨脱)、云南南部和广西西部(百色)。生于山谷林中或溪边阴处,海拔 800—1 300 米,在云南景东可达 2 200 米。在印度东北部、不丹和锡金也有分布。

50. 浆果苣苔属——*Cyrtandra* J. R. et G. Forst.

J. R. et G. Forst. Char. Gen. 5.1776; Clarke in A. DC. Monogr. Phan. 5: 201. 1883.

灌木或亚灌木,稀小乔木。叶对生或互生,边缘全缘或有齿,有羽状脉。聚伞花序腋生,有梗,有多数或少数花;苞片大或小,有时合生。花萼 5 裂,有短或长的萼筒。花冠中等大或大,稀小,漏斗状筒形,檐部通常二唇形,上唇 2 裂,下唇 3 裂。能育雄蕊 2,位于下(前)方,着生于花冠筒上,通常内藏,花药连着或分生,2 药室近平行,顶端不汇合或汇合,退化雄蕊 2 或 3,位于上(后)方,小。花盘环状,或位于一侧。子房卵球形或长圆形,1 室,2 侧膜胎座几乎在子房室中央相遇,2 裂片反曲,有多数胚珠;花柱长或短;柱头近球形或 2 裂。浆果肉质或革质,卵球形或长圆形,不开裂,通常具宿存花柱。种子多数,小,椭圆球形,光滑。

约 350 种,分布于缅甸南部、马来西亚、印度尼西亚,菲律宾及大洋洲。我国有 1 种,产台湾南部。

1. 浆果苣苔

Cyrtandra umbellifera Merr. in Philip. Journ. Sci. 3: 435. 1908; 台湾植物志 4: 672, 图版 1152. 1978. — *C. kotoensis* Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. 25: 412. 1935.

小灌木,高约 1.5 米;枝条圆柱形或具 5 纵稜,无毛,小枝被短柔毛。叶对生,具柄;叶片膜质,长圆状椭圆形,有时稍镰状弯曲,长 16—30 厘米,宽 5—9 厘米,顶端渐尖,基部楔形,常稍斜,边缘上部有小齿,下部全缘,无毛或两面疏被柔毛,侧脉每侧 6—8 条;叶柄长 1—4 厘米,被短柔毛。花序腋生,有 3—4 花;花序梗长 1.5—3 厘米,密被锈色短柔毛;苞片对生,披针形,长约 10 毫米,被短柔毛。花萼长约 5 毫米,外面被褐色短柔毛,5 裂稍超过中部,裂片三角形。花冠白色,长约 10 毫米,外面被短柔毛;筒长约 6 毫米;上唇比下唇稍长,2 浅裂,下唇 3 深裂,裂片近圆形。雄蕊无毛,花丝着生于花冠基部之上,丝形,花药椭圆形;退化雄蕊 2,着生于花冠筒上部。花盘环状。雌蕊伸出花冠筒口部之外,子房卵球形,无毛,花柱散生短腺毛,柱头近球形。浆果椭圆球形,长约 8 毫米,无毛。

产我国台湾南部兰屿岛。在菲律宾也有分布。

我们尚未见到本种标本,以上描述系根据《台湾植物志》写出。