

族5. 尖舌苣苔族——Trib. Klugieae Fritsch

Fritsch in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 143.
 1895.——Subtrib. *Loxotieae* G. Don, Gen. Syst. 4: 664. 1838.——
 Subtrib. *Loxonieae* A. DC. Prodr. 9: 274. 1845.——Subtrib. *Epi-*
themeae A. DC. l. c. 278. 1845.——Trib. *Loxonieae* Burtt in Not.
 Bot. Gard. Edinb. 24: 210. 1962.

叶对生,同一对叶通常极不等大,或互生,基部常极斜。聚伞花序、蠟尾状聚伞花序或假总状花序(花与苞片近交互对生),或花序呈头状,或花序生叶上。花左右对称。花冠多少唇形。雄蕊1或3枚退化。子房球形或卵球形,顶端突然形成花柱。蒴果。

8属,主要分布于亚洲热带及亚热带地区,少数种分布于非洲及北美洲南部和南美洲中部。我国有5属(包括2特有属),分布于西南、华南和台湾。

51. 圆果苣苔属*——*Gyogyne* W. T. Wang

W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(3): 41. 1981.

多年生草本,具短根状茎。茎直立,有2—3节,近不分枝。叶对生,具柄,每1对叶稍不相等,卵形,具羽状脉。聚伞花序顶生,有少数花;花小。花萼斜宽钟状,5浅裂,在裂片之间有纵褶。花冠白色;筒短而粗,基部囊状,檐部二唇形,稍短于筒,上唇2深裂,下唇比上唇长约2倍,3深裂。雄蕊4,分生,内藏,花丝着生于花冠基部之上,钻形,花药基部稍叉开,2室近平行,顶端不汇合,药隔顶端突出成小尖头。退化雄蕊1,小。花盘环状,低。雌蕊与花冠筒近等长,子房扁球形,2枚圆形具胚珠的侧膜胎座自子房壁腹面中央伸向室中,花柱细,比子房长约4倍,柱头小,扁球形。果未详。

1种,特产我国广西西部。

1. 圆果苣苔(植物研究) 图版156

Gyogyne subaequifolia W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(3): 43, pl. 7, fig. 1—7. 1981.

多年生草本。根状茎块状,长0.8—1.5厘米,粗7毫米。茎高9.5—15.5厘米,不分枝,有2—3节,被淡褐色短柔毛。叶对生,每对叶稍不等大,具柄;叶片草质,卵形,长4—8厘米,宽3.4—5.8厘米,顶端急尖或短渐尖,基部斜宽楔形或斜圆形,边缘有不等的牙齿,上面被疏柔毛,下面沿脉疏被短柔毛,侧脉每侧5—6条;叶柄长0.3—2.7厘米,被短柔

* 植物研究, 1卷3期。