

毛。聚伞花序长 2 厘米,约有 5 花;花序梗长 1 厘米,与花梗被柔毛;花梗长 1.5—4 毫米。花萼宽钟状,直径 7 毫米,长 5 毫米,5 裂达基部,外面疏被短柔毛,内面无毛,筒长 2.5 毫米,在裂片之间有纵褶,裂片三角形,长 2.5 毫米。花冠白色,长 10 毫米,外面被短柔毛,内面无毛;筒长 5 毫米,口部斜,直径 5 毫米,基部囊状;上唇长 2.5 毫米,2 裂达基部,裂片卵状三角形,宽 3 毫米,顶端钝;下唇长 4 毫米,3 深裂,裂片宽长圆形,顶端圆形。雄蕊 4,无毛,花丝着生于距花冠基部 0.5 毫米处,长 1.2 毫米,花药长 1.2 毫米,小尖头长 0.2 毫米;退化雄蕊长 0.8 毫米。花盘高 0.2 毫米。雌蕊长 5.5 毫米,无毛,子房直径 1 毫米,花柱细,长 3.8 毫米,柱头扁球形,直径 0.7 毫米。花期 6 月。

特产广西百色。生于低山路边阴处。

52. 十字苣苔属*——*Stauranthera* Benth.

Benth. Scroph. Ind. 57.1835; Clarke in A. DC. Monogr. Phan.

5: 189. 1883. — *Cyananthus* Griff. Notul. Pl. As. 4: 154. 1854.

低矮肉质草本,被柔毛。叶互生,或对生,此时同一对中的 1 枚极小,正常叶镰状椭圆形,两侧极不对称。聚伞花序具长梗,有稀疏的花;苞片小。花萼宽钟状,5 裂,裂片开展,在裂片之间有纵褶。花冠钟状,基部具距或囊状,檐部不明显 2 唇形,上唇 2 裂,下唇 3 裂。能育雄蕊 4,花丝短,花药以侧面合生成扁圆锥状,二药室基部稍叉开,以纵缝开裂,顶端最后汇合。花盘不存在。子房近球形,花柱短,柱头宽漏斗状,2 侧膜胎座内伸,二裂,密生胚珠。蒴果扁球形,果皮纸质,横裂或不规则开裂。种子小,倒卵球形,光滑。

约 10 种,分布于亚洲南部和东南部热带地区。我国有 1 种,分布于云南南部、广西西部和海南。

1. 十字苣苔(海南植物志) 图版 157

Stauranthera umbrosa (Griff.) Clarke, Comm. et Cyrt. Beng. t. 89. 1874; in A. DC. Monogr. Phan. 5: 189. 1883; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 371. 1884; Pellegr. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 560. 1930; Merr. in Lingn an Sci. Journ. 6: 286. 1930; 海南植物志 3: 527. 图 904. 1974; 中国高等植物图鉴 4: 121. 图 5656. 1975. — *Cyananthus umbrosa* Griff. Notul. Pl. As. 4: 154. 1854.

多年生草本。茎高 4—22 厘米,粗 3—5 毫米,分枝或不分枝,上部及叶柄均被锈色短柔毛。正常叶具短柄;叶片草质,两侧不对称,长圆形或椭圆状倒卵形,长 8—25 厘米,宽 3.5—10 厘米,顶端渐尖,基部在狭侧楔形、在宽侧宽楔形或圆形,边缘在狭侧上部、在宽侧下部之上有波状浅齿,上面变无毛,下面沿脉疏被短柔毛,侧脉在狭侧 7—8 条,在宽侧约