

无毛;筒长约 5 毫米,口部直径 1.5—2 毫米;上唇长约 2 毫米,裂片宽卵形或半圆形,下唇长 5 毫米,椭圆形,3 浅裂。雄蕊 2,位于前方,无毛,花丝着生于距花冠基部 3.5 毫米处,线形,长约 2 毫米,花药长 1 毫米,2 室近平行;退化雄蕊 2,位于后方,着生于距花冠基部 3 毫米处,长约 0.8 毫米。雌蕊长约 6.5 毫米,无毛,子房卵球形,花柱长约 4 毫米,柱头球形。蒴果椭圆球形,长约 4 毫米。种子长椭圆球形,长约 0.3 毫米。花期 7—10 月。

产云南(贡山、屏边)、贵州(册亨)。生于山地林中或陡崖阴处,海拔 1 500—2 200 米。在尼泊尔、印度、斯里兰卡、缅甸、中南半岛、马来西亚、印度尼西亚也有分布。

2b. 全唇尖舌苣苔(植物研究)(变种) 大脖子药(贵州兴义)

Rhynchoglossum obliquum var. **hologlossum** (Hayata) W.T. Wang in Bull. Bot. Res. 4(1): 31. 1984. —*R. hologlossum* Hayata, Ic. Pl. Forms. 5: 131. 1915: Kao et DeVol in Taiwania 17(2): 161. 1972; 台湾植物志 4: 679, pl. 1155. 1978. —*R. obliquum* auct. non Bl.: Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 25(19): 178. 1908; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 887. 1936.

与尖舌苣苔的区别: 花冠下唇不分裂。

产云南西部和南部、四川西南部(盐边)、贵州西南部(兴义)、广西西部及台湾。生于山地林边、林中、石山洞中、石崖阴处,在云南西南部海拔可达 2 300 米,在中部景东至蒙化一带 1 700—1 900 米,在西北部、南部、东南部为 1 350—1 600 米,在四川盐边为 2 000 米,在广西西部为 500—730 米。模式标本采自我国台湾。

根药用,治甲状腺肿大(贵州中草药)。

55. 盾座苣苔属*——*Epithema* Bl.

Bl. Bijdr. 737. 1826; Clarke in A. DC. Monogr. Phan. 5: 176.

1883.

肉质小草本。茎不分枝或有短分枝。叶 1 或少数,下部的互生,上部的常对生,具柄或无柄,卵形或心形。蠅尾状聚伞花序生茎上部叶腋,具花序梗,分生或与叶柄及叶片基部合生;苞片 1,大,卵形或基部边缘合生而呈船形;花小,密集,具短梗。花萼钟状,5 裂,裂片三角形,在芽时镊合状排列。花冠蓝色或白色,有较长筒,檐部短,二唇形,上唇 2 裂,下唇 3 裂,裂片近等大。能育雄蕊 2,位于上(后)方,花药近球形,连着,二室极叉开,顶端汇合;退化雄蕊 2,小,位于下(前)方。花盘环状或位于子房一侧。子房卵球形,花柱丝形;柱头近头状,胎座具柄,盾状,全部生胚珠。蒴果球形,果皮膜质,被宿存花萼包著,周裂。种子长圆形或椭圆球形,两端尖,光滑。

* 植物分类学报, 2 卷 4 期。