

Steenis, Fl. Males., ser. 1, **8**(2): 281, fig. 4. 1977; 江苏植物志, 下册: 771, 图 2020. 1982. ——*U. wallichiana* Benj. in Bot. Zeit. **3**: 213. 1845, non Wight, 1850. ——*Philydrum cavaleriei* Lévl. in Bull. Herb. Boiss. Ser. 2, **6**: 506. 1906. ——*Utricularia biflora* Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo **30**: 210. 1911; Ic. Pl. Formos. **2**: 125. 1913, non Lamk. 1804.

陆生小草本。假根少数, 丝状, 基部增厚, 具多数长 0.5—1 毫米的乳头状分枝。匍匐枝少数, 丝状, 具分枝。叶器生于匍匐枝上, 于开花前凋萎或于花期宿存, 狭线形或线状倒披针形, 顶端急尖或钝形, 长 7—30 毫米, 宽 1—4 毫米, 膜质, 无毛, 具 1 脉。捕虫囊生于叶器及匍匐枝上, 球形, 侧扁, 长 0.6—1 毫米, 具柄; 口基生, 上唇具 2 条钻形附属物, 下唇钝形, 无附属物。花序直立, 长 2—40 厘米, 中部以上具 1—16 朵疏离的花; 花序梗圆柱状, 粗 0.3—1 毫米, 上部光滑, 下部具细小的腺体, 具 1—5 鳞片; 苞片与鳞片相似, 基部着生, 宽卵状长圆形, 顶端钝, 长约 1 毫米; 小苞片线状披针形, 长约 0.5 毫米; 花梗长 2—5 毫米, 丝状, 具翅, 于花期直立, 花后伸长并下弯。花萼 2 裂达基部, 上唇稍大, 裂片宽卵形, 顶端钝, 基部下延, 花期长 3—4 毫米, 果期增大, 长 5—6 毫米, 无毛。花冠黄色, 长 6—10 毫米, 外面无毛; 上唇狭长圆形或长卵形, 顶端圆形, 长 3—4.5 毫米, 宽 2—3 毫米, 下唇近圆形, 长 4—4.5 毫米, 宽 3.5—4 毫米, 顶端圆形或具 2—3 浅圆齿, 喉凸隆起呈浅囊状; 距钻形, 长 3—5 毫米, 与下唇成锐角或钝角叉开。雄蕊无毛; 花丝线形, 长约 1 毫米, 近伸直, 上部略膨大; 药室于顶端汇合。雌蕊无毛; 子房卵球形; 花柱短而显著; 柱头下唇近圆形, 反曲, 上唇较短, 钝形。蒴果宽椭圆球形, 背腹扁, 果皮膜质, 长 2.5—3 毫米, 室背开裂。种子多数, 卵球形或长球形, 长 0.4—0.6 毫米; 种皮无毛, 具网状突起, 网格纵向延长, 多少扭曲。花期 6—12 月, 果期 7 月—次年 1 月。

产山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川和云南。生于沼泽地、稻田或沟边湿地, 海拔 40—1350 米。也分布于印度、孟加拉、中南半岛、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、日本和澳大利亚北部。

2. 缠绕挖耳草(植物研究) 高山挖耳草(云南种子植物名录)

Utricularia scandens Benj. in Linnaea **20**: 309. 1847; P. Taylor in Steenis, Fl. Males., ser. 1, **8**(2): 283, fig. 6. 1977; 云南种子植物名录, 下册 1635. 1984. ——*U. wallichii* Wight in Journ. Bot. Kew Misc. **1**: 372. 1849. ——*U. wallichiana* Wight, Ic. Pl. Ind. Or. tab. 1572. 1850, non Benj. 1845; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**: 332. 1884; Pellegr. in Lecomete, Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 484. 1930.

2a. 缠绕挖耳草(原亚种) 图版 162: 11—15

U. scandens subsp. *scandens*

陆生小草本。假根多数, 丝状, 具长约 0.5 毫米的乳头状分枝。匍匐枝具少数丝状分枝。叶器生于匍匐枝上, 线形, 膜质, 长 0.6—1 厘米, 宽约 1 毫米, 具 1 脉, 顶端圆形或近