

下唇并与其成直角或锐角叉开。雄蕊无毛;花丝线形,明显弯曲,上部扩大,长约 0.6 毫米;2 药室汇合。雌蕊无毛;子房球形;花柱粗短;柱头下唇半圆形,上唇消失。蒴果球形,长约 2 毫米,果皮膜质,室背开裂。种子多数,近球形,长 0.25—0.3 毫米,种皮薄,无毛,具网状突起,网格近等径。花期 8—9 月,果期 9—10 月。

产广东和广西南部。生于水湿草地或稻田中。也分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚和澳大利亚。

本种无小苞片,花冠下唇 2 深裂,容易识别。

11. 盾鳞狸藻(植物研究)

Utricularia punctata Wall. [Cat. n.1496.1829, nom. nud.] ex A. DC. in DC. Prodr. **8**:5.1844; Wight, Ic. Pl. Ind. Or. tab. 1570.1850; Oliv. in Journ. Linn. Soc. Bot. **3**: 175. 1859; Merr. Enum. Born. 538. 1921; P. Taylor in Steenis, Fl. Males., ser. 1, **8**(2):293, fig. 19.1977.

水生草本。通常无假根。匍匐枝圆柱状,具稀疏的分枝,长 6—20 厘米,粗 0.5—2 毫米,无毛。叶器多数,互生,长 2—6 厘米,2 或 3 深裂几达基部,裂片先羽状深裂,后二至数回二歧状深裂;末回裂片毛发状,顶端及边缘具小刚毛,其余部分无毛。无冬芽。捕虫囊少数,侧生于叶器裂片上,斜卵球形,侧扁,长 1—2 毫米,具短柄;口侧生,边缘疏生小刚毛,上唇具 2 条分枝的刚毛状附属物,下唇无附属物。花序直立,长 6—20 厘米,中部以上具 5—8 朵多少疏离的花,无毛;花序梗圆柱状,粗 0.5—1 毫米,具 1—2 个与苞片同形的鳞片;苞片中部着生,呈盾状,卵形,顶端急尖,基部圆形,膜质,长 2—2.5 毫米;无小苞片;花梗丝状,直立或上升,花期长 3—5 毫米,果期长 4—10 毫米。花萼 2 裂达基部,无毛,裂片近相等,圆形,膜质,上唇长 1.8 毫米,下唇长 1.5 毫米。花冠淡紫色,喉突具黄斑,长 6—10 毫米,无毛;上唇近圆形,长为上方萼片的 2 倍半或 3 倍,下唇较大,横长圆状椭圆形,基部耳状,顶端圆形,两侧边缘内卷,喉凸隆起呈浅囊状;距圆锥状,稍弯曲,顶端钝形,略短于下唇并与其平行或成锐角叉开。雄蕊无毛;花丝线形,弯曲,上方明显膨大,长约 1.5 毫米;药室汇合。雌蕊无毛;子房卵球形,表面具微小的疣状突起;花柱约与子房等长;柱头下唇圆形,上唇微小,正三角形,蒴果椭圆球形,长约 3 毫米,果皮膜质,无毛,室背开裂。种子少数,双凸镜状,宽 1.5—2 毫米,边缘环生具不规则牙齿的翅。花期 6—8 月,果期 7—9 月。

产福建南部。生于低海拔的稻田灌溉渠中。也分布于中南半岛、马来西亚和印度尼西亚的苏门答腊。

12. 少花狸藻(海南植物志) 丝叶狸藻(台湾植物志) 图版 164: 8—10

Utricularia exoleta R.Br. Prodr. Nov. Holl. **1810**:430. 1810; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:223.1890; Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**:183. 1940;海南植物志 **3**: 517. 1974; P. Taylor in Steenis, Fl. Males., ser. 1, **8**(2): 294, fig. 20.