

and Ginkgo. ed. 4. 172. 1966.——*Retinispora filicoides* R. Smith, Pl. Fir Tribe 38. 1874.——*Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *filicoides* (R. Smith) Hartwig et Rümpler, Bäume Sträuch. 660. 1875; Kent, Veitch's Man. Conif. ed. 2. 221, f. 65. 1900; Rehd. Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2. 59. 1940.——*Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl. f. *filicoides* (R. Smith) Beissn. Syst. Eintheil. Conif. 14. 1887.

灌木,枝条短,末端鳞叶分枝短,扁平,在主枝上排列密集,外观象凤尾蕨状;鳞叶钝,常有腺点。

我国庐山、南京、杭州等地栽培供观赏。生长较慢。

7. 福建柏属——*Fokienia* Henry et Thomas

Henry et Thomas in Gard. Chron. ser. 3. 49; 66. 1911.

常绿乔木;生鳞形叶的小枝扁平,三出羽状分枝,排成一平面。鳞叶交叉对生,二型,小枝上下中央之叶紧贴,两侧之叶对折、瓦覆于中央之叶的边缘,小枝下面中央之叶及两侧之叶的下(背)面有粉白色气孔带。雌雄同株,球花单生于小枝顶端;雌球花有6—8对交叉对生的珠鳞,每珠鳞的基部有2枚胚珠。球果翌年成熟,近球形;种鳞6—8对,熟时张开,木质,盾形,基部渐窄,顶部中央微凹,有一凸起的小尖头,能育的种鳞各具2粒种子;种子卵形,具明显的种脐,上部有两个大小不等的薄翅;子叶2枚,发芽时出土。

本属模式种:福建柏 *Fokienia hodginsii* (Dunn) Henry et Thomas (*Cupressus hodginsii* Dunn)

本属仅有1种,分布于浙江、福建、江西、湖南、广东、贵州、云南及四川等省。越南北部也有分布。

福建柏(经济植物手册) 建柏(中国树木分类学),滇柏(中国树木分类学),广柏(中国裸子植物志),滇福建柏(经济植物手册) 图版73: 6—9, 图版74: 8—13

Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas in Gard. Chron. ser. 3. 49; 66. t. 32—33. 1911; Merr. in Philipp. Journ. Sci. Bot. 30: 491. t. 16. 1912; Chun, Chinese Econ. Trees 36. 1921, 中山大学农林植物所专刊 1: 211. 1934; Dallimore and Jackson, Handb. Conif. 229. t. 50. 1923, ed 3. 287. t. 51. 1948, rev. Harrison, Handb. Conif. and Ginkgo. ed. 4. 227. t. 46. 1966; Pilger in Engler u. Prantl. Pflanzenfam. ed. 2. 13: 391. t. 207.