

等人曾将采自四川城口、贵州安顺、甘肃渭源和舟曲(西固)及台湾新高山的标本分别鉴定为 *J. squamata* var. *fargesii* Rehd. et Wils., *J. lemeana* Lévl. et Blin., *J. kansuensis* Kom. 及 *J. morrisonicola* Hayata. 经查核各原始文献及大量标本(其中包括上列各种的原产地标本), 他们列举的主要特征并非稳定的形态性状, 故予归并。本种与垂枝香柏 *S. pingii* (Cheng) Cheng et W. T. Wang 及其变种香柏 “var. *wilsonii* (Rehd.) Cheng et L. K. Fu” 的亲缘关系密切, 其区别在于它的生叶小枝不呈柱状六棱形, 叶通常较长, 叶背沿脊具细纵槽。

粉柏(栽培变种)(中国树木学) 山柏树(中国树木分类学), 翠柏(华北经济植物志要)

cv. ‘**Meyeri**’, Dallimore and Jackson, rev. Harrison, Handb. Conif. and Ginkgo. ed. 4. 276. 1966.——*Juniperus squamata* Buch.-Hamilt. var. *meyeri* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 3: 207. 1922, ibidem 4: 127. 1923, Man. Cult. Trees and Shrubs 11. 1927, ed. 2. 63. 1940, et Bibliogr. 58. 1949; Beissn. u. Fitch. Handb. Nadelh. ed. 3. 593. 1930; Bailey, Cult. Conif. 191. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 69. 1937; Dallimore and Jackson, Handb. Conif. ed. 3. 327. 1948; 郝景盛, 中国裸子植物志, 再版 97. 1951; 北京师范大学生物系, 北京植物志, 上册 126. 1962.——*Sabina lemeana* (Lévl. et Blin.) Cheng et W. T. Wang var. *meyeri* (Rehd.) Cheng et W. T. Wang, 中国树木学 1: 251. 1961.

直立灌木, 小枝密。叶排列紧密, 上下两面被白粉, 条状披针形, 长 6—10 毫米, 先端渐尖。球果卵圆形, 长约 6 毫米。

粉柏系栽培植物, 天津、北京、上海、南京、杭州、庐山、山东、河南、江苏等省市栽培作庭园树或盆栽。

粉柏与高山柏的区别在于叶的上下两面均被白粉。

3. 垂枝香柏(植物分类学报) 乔桧(经济植物手册)

Sabina pingii (Cheng ex Ferré) Cheng et W. T. Wang, comb. nov. —*Juniperus pingii* Cheng in Trav. Lab. Forest. Toulouse V, 1 (2): 93. 1939, sine descrip. lat., et apud Ferré, ibidem II, 2 (2): 10. 1941; 郑万钧, 中大林学所报告, 树木学 1: 2. 1947.

Sabina pingii (Cheng ex Ferré) Cheng et W. T. Wang var. *pingii*
图版 82: 1—3