

附属物；花柱无毛；柱头3裂。蒴果圆桶状，长5—6毫米，稍弯曲，成2片裂开，每片有2列种子，每列14粒。种子椭圆形，黑色，被微柔毛。

产云南南部，模式标本采自河口。

3. 金长莲（四川长宁） 秤砣草（四川合江）

Staurogyne sichuanica H. S. Lo in Bull. Bot. Res. **8** (1): 2. 1988.

草本，高10—25厘米；茎近圆柱形，有细纵条纹，紫黑色，被稀疏短柔毛。叶对生，叶柄紫色，长1—2厘米，被稀疏柔毛；叶片卵状披针形或椭圆状披针形，长4—9厘米，宽1.3—3厘米，先端渐尖，基部楔形至宽楔形，有时两边稍不等，两面被极稀疏糙硬毛和柔毛，侧脉6—11对，两面凸起，背面脉不明显。总状花序顶生于叶腋短枝，长3.5—6厘米，有疏松互生的花2—5朵，总花梗及花轴有微柔毛；花梗长4—7毫米；苞片生于花梗基部，小苞片生于花梗上部距花萼1.6毫米处，苞片与小苞片相等，线形，长约5.5毫米，宽0.5毫米，两面几无毛，有缘毛，1脉；花萼长约11毫米，5深裂几至基部，裂片线形，前、后裂片长9—11毫米，宽1.2毫米，两侧裂片长10毫米，宽0.6毫米，两面几无毛，边缘有缘毛，3脉；花冠未见。未成熟蒴果长5毫米。

产四川（长宁、合江）。生于海拔560米的竹林下。

本种与 *Staurogyne filipes* E. Hossain (in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **31**: 383. 1972) 非常相似，仅后者的萼裂片较狭，植株被长柔毛。

4. 大花叉柱花

Staurogyne sesamoides (Hand.-Mazz.) B. L. Burtt in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **22**: 310. 1958; H. S. Lo in Acta Phytotax. Sin. **17** (4): 84. 1979. — *Loxostigma* (?) *sesamoides* Hand.-Mazz. in Oest. Bot. Zeitschr. **85**: 217. 1936. — *Staurogyne dolichocalyx* E. Hossain in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **31**: 380. 1972.

直立草本，高达35厘米；茎枝有绒毛，不久渐脱落，有纵棱，通常不分枝。叶对生，草质，叶柄长1.5—4厘米，被绒毛；叶片椭圆披针形，长5—13厘米，宽2—5.5厘米，先端渐尖或有时急尖，基部楔形，上面无毛，背面仅脉上被短柔毛，侧脉8—11对，全缘或有时成不规则浅波状。总状花序顶生或腋生，不分枝，稍下垂，花后延伸，花较密集，总梗及花轴有柔毛；花具短梗，花梗长0.8—1毫米，果时可达5毫米，被绒毛；苞片披针形，先端渐尖，长6—6.5毫米，宽约2—2.2毫米，3脉，被柔毛；小苞片披针形，长8—8.5毫米，宽2毫米，着生花梗先端，被柔毛；花萼裂片5，近相等，狭披针形，长渐尖，被柔毛，后裂片长1.8—2.2厘米，宽2—2.5毫米，侧裂片长1.6—2厘米，宽1.2毫米，前裂片长1.8—2.1厘米，宽1.8—2毫米；花长可达3—4厘米，花冠白色或淡红白色，冠檐裂片5，近圆形，近相等，径约1厘米；能育雄蕊4，2强，着生于喉基部，花丝被头状腺毛，上面密，向下渐稀疏，长花丝长17毫米，另2