

附属物；花柱无毛；柱头3裂。蒴果圆桶状，长5—6毫米，稍弯曲，成2片裂开，每片有2列种子，每列14粒。种子椭圆形，黑色，被微柔毛。

产云南南部，模式标本采自河口。

3. 金长莲（四川长宁） 秤砣草（四川合江）

Staurogyne sichuanica H. S. Lo in Bull. Bot. Res. **8** (1): 2. 1988.

草本，高10—25厘米；茎近圆柱形，有细纵条纹，紫黑色，被稀疏短柔毛。叶对生，叶柄紫色，长1—2厘米，被稀疏柔毛；叶片卵状披针形或椭圆状披针形，长4—9厘米，宽1.3—3厘米，先端渐尖，基部楔形至宽楔形，有时两边稍不等，两面被极稀疏糙硬毛和柔毛，侧脉6—11对，两面凸起，背面脉不明显。总状花序顶生于叶腋短枝，长3.5—6厘米，有疏松互生的花2—5朵，总花梗及花轴有微柔毛；花梗长4—7毫米；苞片生于花梗基部，小苞片生于花梗上部距花萼1.6毫米处，苞片与小苞片相等，线形，长约5.5毫米，宽0.5毫米，两面几无毛，有缘毛，1脉；花萼长约11毫米，5深裂几至基部，裂片线形，前、后裂片长9—11毫米，宽1.2毫米，两侧裂片长10毫米，宽0.6毫米，两面几无毛，边缘有缘毛，3脉；花冠未见。未成熟蒴果长5毫米。

产四川（长宁、合江）。生于海拔560米的竹林下。

本种与 *Staurogyne filipes* E. Hossain (in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **31**: 383. 1972) 非常相似，仅后者的萼裂片较狭，植株被长柔毛。

4. 大花叉柱花

Staurogyne sesamoides (Hand.-Mazz.) B. L. Burtt in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **22**: 310. 1958; H. S. Lo in Acta Phytotax. Sin. **17** (4): 84. 1979. — *Loxostigma* (?) *sesamoides* Hand.-Mazz. in Oest. Bot. Zeitschr. **85**: 217. 1936. — *Staurogyne dolichocalyx* E. Hossain in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **31**: 380. 1972.

直立草本，高达35厘米；茎枝有绒毛，不久渐脱落，有纵棱，通常不分枝。叶对生，草质，叶柄长1.5—4厘米，被绒毛；叶片椭圆披针形，长5—13厘米，宽2—5.5厘米，先端渐尖或有时急尖，基部楔形，上面无毛，背面仅脉上被短柔毛，侧脉8—11对，全缘或有时成不规则浅波状。总状花序顶生或腋生，不分枝，稍下垂，花后延伸，花较密集，总梗及花轴有柔毛；花具短梗，花梗长0.8—1毫米，果时可达5毫米，被绒毛；苞片披针形，先端渐尖，长6—6.5毫米，宽约2—2.2毫米，3脉，被柔毛；小苞片披针形，长8—8.5毫米，宽2毫米，着生花梗先端，被柔毛；花萼裂片5，近相等，狭披针形，长渐尖，被柔毛，后裂片长1.8—2.2厘米，宽2—2.5毫米，侧裂片长1.6—2厘米，宽1.2毫米，前裂片长1.8—2.1厘米，宽1.8—2毫米；花长可达3—4厘米，花冠白色或淡红白色，冠檐裂片5，近圆形，近相等，径约1厘米；能育雄蕊4，2强，着生于喉基部，花丝被头状腺毛，上面密，向下渐稀疏，长花丝长17毫米，另2

长 13 毫米，花药室卵形，长 2.5 毫米，宽 1.5 毫米，药室开裂边缘有硬毛，具附属物。子房无毛，每室有 2 列胚珠，共约 60 枚；花柱长 2 厘米，被极稀疏柔毛；柱头三角形，有 2 裂片，后裂片椭圆形，长 3 毫米，宽 2 毫米，前裂片长与宽同 4 毫米，2 裂片边缘成流苏状。蒴果狭椭圆形，先端急尖。种子小，角球形，种皮蜂窝状。

产广东和广西。生于海拔 800 米以下的湿润山谷或林下。越南也有分布。模式标本采自广东。

5. 弯花叉柱花 (植物研究)

Staurogyne chapaensis R. Ben. in Bull. Mus. Hist. Nat. **2** (5): 172. 1933 et in H. Lec, Fl. Gen. Indo-Chine **4**: 631. f. 70 (7). 1935; H. S. Lo in Bull. Bot. Res. **8** (1): 1. 1988.

草本，茎缩短。叶对生丛生，成莲座状，叶柄连同叶脉棕红色（干时），疏被棕色长柔毛，长达 11 厘米，叶片卵形，长卵形，长圆形至狭长圆形，长 2.5—14.5 厘米，宽 2—6 厘米，先端通常圆钝，基部心形，上面绿色被稀疏多节长柔毛，背面苍白色，几无毛，羽状脉侧脉 7—9 对，上面几无毛，背面被极长多节柔毛，边缘全缘或不明显波状。总状花序顶生成腋生，总梗长约 4 厘米，连同花轴被长柔毛，花轴约与花梗等长，多花，苞片互生，倒卵形或线状匙形，长 5.5—3.5 厘米，内无毛，背面被柔毛；花梗长 3 毫米，被柔毛；小苞片着生于花梗上端，线状匙形，长 5.1 毫米，宽 1.6 毫米，先端钝圆，内面无毛，外面被疏柔毛，有缘毛；花萼不等 5 裂，裂片后方一枚线状匙形，长 8 毫米，（最）宽 2 毫米，先端钝圆，内面无毛，外面被疏柔毛，具缘毛，前 2 裂片与后 1 片同形，略短，两侧 2 片小，线形，长 5 毫米，宽 0.5 毫米，被毛同其他 3 片；花冠淡蓝紫毛，冠檐 5 裂，裂片圆形，近相等，能育雄蕊 4，2 上 2 下，上方的花丝长 2 毫米，下方的花丝 1.1 毫米，无毛。花药近等大，每药室基部具一长方形附属体，在药室背部药隔宽，椭圆形；子房长椭圆体形，长 2 毫米，径 1 毫米，无毛，花柱 5.5 毫米，无毛。果实未见。

产广东（阳山、从化、高要）、广西（三江、大苗山、大瑶山）及云南东南部（马关）。生于海拔 1000—1800 米的林下。越南北部有分布。

6. 中华叉柱花 (海南植物志)

Staurogyne sinica C. Y. Wu et H. S. Lo in Fl. Hainan. **3**: 538—539. f. 914. et 590 (Addenda). 1974. — *Staurogyne major* auct. non R. Ben., Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 185. 1940. quoad. F. C. How 71822.

一年生草本，茎极缩短，密被长柔毛。叶基生成莲座状，纸质；叶柄长 0.5—3 厘米，被长柔毛；叶片卵状长圆形，长 4—9 厘米，宽 1—4.5 厘米，先端圆，基部圆或宽楔形，上面绿色，被柔毛，后脱落仅脉上被毛，背面苍白色，脉上被长柔毛，侧脉 5—7 对，边全缘。总状花序顶生或腋生，长 3—12 厘米，花疏生，总梗及花轴有或长或短