

柔毛；叶片匙形、匙状长圆形或匙状披针形，长 1.2—7 厘米，宽 0.4—1.8 厘米，先端圆钝，基部渐狭，近全缘或稍波状，上面具小凸点及被稀疏柔毛，背面苍白色，被稀疏柔毛，脉在上面不明显，在背面明显，被长柔毛。总状花序顶生或近顶腋生，疏花，长 4—15 厘米，总花梗及花轴纤细，被柔毛；苞片匙状线形，长 3—4 毫米，小苞片线形与苞片近等长，皆 1 脉和背面被柔毛，内面无毛，小苞着生于花梗先端稍下；花梗长约 1 厘米，被柔毛；花萼 5 深裂至基部，裂片线形，近等长，侧裂片稍短，并先端异色（白色），花冠红色，芳香，长约 10 毫米，5 裂，前裂片长圆形，其余裂片近圆形，基部 3 毫米宽；前雄蕊长约 7 毫米，略超出喉部，后雄蕊长约 5 毫米，前后 2 雄蕊花药长 1 毫米，宽 1.3 毫米，花丝无毛，药室卵形；子房长圆形，无毛，花柱长 8 毫米，柱头长 2 毫米，不等 2 裂。蒴果未见。

产广东、海南、福建及台湾。生于低海拔林下。日本琉球也有分布。

11. 海南叉柱花 (海南植物志)

Staurogyne hainanensis C. Y. Wu et H. S. Lo in Fl. Hainan. 3: 540 et 589 (Addenda). 1974.

多年生草本，茎直立，高达 30 厘米，圆柱状，被长柔毛。叶集生枝顶，叶柄长 1—3 厘米，密被长柔毛；叶片近革质，长圆形到长圆披针形，长 3—10 厘米，宽 1.3—3.5 厘米，先端通常圆，基部楔形或宽楔形，边缘近全缘至不规则浅波，上面除中脉被稀疏长柔毛外无毛，背面被脉上被贴伏长柔毛，侧脉 6—10 对。花序总状，顶生或腋生，疏花，长达 16 厘米，被柔毛；苞片互生，线状匙形或线形，长 2.5—5 毫米，1 脉，花梗长约 3 毫米，小苞片着生于花梗中部以上，与苞片近相等；萼裂片线形，先端渐尖，长 5—6 毫米，近无毛，3 脉，侧裂片稍短；花冠紫红色长约 8 毫米，冠檐裂片卵状长圆形，长 1.2—1.4 毫米，先端近圆形，花丝无毛，前雄蕊药室不等大一小，后雄蕊药室相等，不育雄蕊长约 0.7 毫米；子房卵形，长约 1 毫米，无毛，花柱长约 6 毫米。蒴果卵状长圆形，长约 5 毫米，无毛。

仅产海南西部和西南部。

12. 琼海叉柱花 (海南植物志)

Staurogyne strigosa C. Y. Wu et H. S. Lo in Fl. Hainan. 3: 541 et 590 (Addenda). 1974.

一年生草本，茎极缩短，被长柔毛。叶基生成莲座状，纸质；叶柄长 0.5—2.2 厘米，被长柔毛；叶片椭圆形、长圆形、卵形或长圆状倒卵形，长 1—1.5 厘米，宽 0.8—2.5 厘米，先端圆或钝，基部宽楔形或圆形，上面被长而有节的糙伏毛，毛脱落后球状毛基宿存，背面被长柔毛，侧脉 5—7 对，边全缘。总状花序顶生或腋生，长达 6 厘米，不分枝或有少数分枝，花疏生，总梗及花轴被多节柔毛，花梗长 1—3 毫米；苞片匙状线形，先端圆或急尖，长 6 毫米，连同小苞片及萼外面被多节柔毛，着生花梗