

长 5 毫米，径 2 毫米，2 片，每片具 4—8 种子。种子宽椭圆形，有小突起。

产云南南部、广西南部（龙州）。生于海拔 350—1500 米的山谷疏林等湿润处。本种广布于旧大陆热带。

亚科 3. 老鼠簕亚科 Acanthoideae Lindau emend. Bremek.

花萼 4—5 裂；冠管极短，几球形或很狭长圆柱形。上唇缺，下唇 3—5 裂；雄蕊 4，花药 1 室，花粉粒具裂缝式纹饰（spaltenpollen）；胚珠每室 2 粒。蒴果具珠柄钩。

5. 老鼠簕属 *Acanthus* L.

L. Sp. Pl. 639.1753; Nees Pl. As. Rar. 3: 76.1832. et in DC. Prodr.

11: 269.1847.

灌木或草本，直立或攀缘，常稍肉质。叶对生，羽状分裂或浅裂，常有齿及刺，稀全缘。穗状花序，顶生，苞片大，边缘常具刺，小苞片较小或无，萼裂片 4，前后两裂片较大，基部常软骨质，两侧的较小；花冠 2 唇，上唇极小而成单唇状，下唇大，伸展，3 裂，花冠管短，常为软骨质；雄蕊 4，近等长或 2 强，着生于喉部，花丝粗厚，后雄蕊花丝先端变细，有时成 S 状弯曲，花药长圆形，1 室，具髯毛。花盘无，子房 2 室，每室 2 胚珠，花柱短，柱头 2 裂。蒴果椭圆形，两侧压扁，有光泽，栗棕色，含 4 种子。种子两侧压扁，近圆形或宽卵形，有珠柄钩。

有 30 余种，分布于亚洲、非洲和地中海等热带、亚热带地区。我国有 4 种，广东、福建各 2 种，云南 1 种。常见引种栽培虾蟆花（*A. mollis* 模式种）。

属名模式：*Acanthus mollis* L.

分种检索表

1. 花有 2 枚小苞片，叶片先端急尖。

2. 叶近革质，3—5 浅裂的裂片三角形，脉自裂片顶端突出成一尖刺，主脉在叶背面明显凸出，无毛；苞片边缘无刺…………… 1. 老鼠簕 *A. ilicifolius* L.

2. 叶硬纸质，3—5 浅裂的裂片圆形或三角形，脉不自裂片顶端突出，主脉在叶背面不明显凸起，被褐色柔毛；苞片边缘有刺…………… 2. 刺苞老鼠簕 *A. leucostachyus* Wall. ex Nees

1. 花无小苞片。

3. 叶先端平截，边缘羽状分裂，侧脉粗，直贯齿尖…………… 3. 小花老鼠簕 *A. ebracteatus* Vahl

3. 叶先端急尖，边缘浅波状，侧脉较细，不直贯齿尖……………

…… 3b. 厦门老鼠簕 *A. ebracteatus* var. *xiamenensis* (R. T. Zhang) C. Y. Wu et C. C. Hu